

Research Paper



Evaluation the Effect of the Health Promoting Lifestyle by Multimedia Education on Sexual Function in Women With Multiple Sclerosis

Masoomeh Kheirkhah^{1*}, Azadeh Ahadi¹, Seyed Massood Nabavi², Najmeh Tavakkol³, Tayebeh Lotfi⁴Use your device to scan
and read the article online

Citation Kheirkhah M, Ahadi A, Nabavi SM, Tavakkol N, Lotfi T. [Evaluation the Effect of the Health Promoting Lifestyle By Multimedia Education on Sexual Function in Women With Multiple Sclerosis (Persian)]. *Iran Journal of Nursing*. 2022; 35(1):76-93. <http://dx.doi.org/10.32598/ijn.35.1.2986.1>

doi <http://dx.doi.org/10.32598/ijn.35.1.2986.1>



ABSTRACT

Background & Aims Multiple sclerosis is the most common progressive neurological disease in young people and affects women several times more than men. Sexual problems are one of the most common symptoms in affected women, which have a great impact on the couple's relationship and are often ignored. Therefore, the present study aimed to determine the effect of health-promoting multimedia education on sexual function in women with multiple sclerosis.

Materials & Methods The present study is a randomized controlled trial of before and after with the control group. 116 women with multiple sclerosis, referred to Hazrat Rasool Akram Hospital and a private referral center for multiple sclerosis patients (from 21 September 2020 to 19 January 2021) were selected by continues sampling method to participate in the study. They were assigned as two groups, intervention and control ones, using the Sealed envelope randomized online site which randomly divided to single up to quintuple blocks, which allocated equally in intervention and control groups. Data collection tools were demographic profile form and intimacy and sexual activity questionnaire for multiple sclerosis patients (MSISQ-19). Data analysis is done by using descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency and percentage) and with independent t-test, chi-square, analysis of covariance and analysis of variance with repeated measures RM using SPSS software v. 16.

Results Before the intervention, there was no significant difference between the two groups in terms of sexual function scores and all its dimensions ($P=0.690$). Mean sexual function in the intervention group at 4 weeks ($P=0.014$) and 12 weeks after the intervention ($P=0.021$) was significantly lower than before, but there was no statistically significant difference between the scores at 4 weeks and 12 weeks after the intervention ($P<0.050$).

Conclusion Health-promoting lifestyle (HPL) training has an effect on sexual performance of women with multiple sclerosis and this training can be a good way to improve their sexual problems.

Keywords:

Multiple sclerosis,
Sexual function,
Health promotion life
style

1. Department of Midwifery and Reproduction Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2. Department of Brain and Cognitive Sciences, Institute of Biology and Technology of Stem Cells, Jihad University, Tehran, Iran.
3. Porsina Hakim Gastrointestinal Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4. Rasoul Akram Clinical Research Development Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

*** Corresponding Author:**

Masoomeh Kheirkhah,

Address: Department of Midwifery and Reproduction Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Tel: +98 (912) 4787691

E-Mail: kheirkhah.m@iums.ac.ir

Extended Abstract

Introduction

Multiple sclerosis is the most common progressive neurological disease in young people, affecting women several times more than men. Sexual problems are one of the most common symptoms in women with multiple sclerosis that is often neglected. The main aim of this study is evaluate the effect of health promoting lifestyle (HPL) education in multimedia method on the sexual function of women with Multiple Sclerosis.

Materials and Methods

The present study is a randomized controlled trial of before and after with the control group. 116 women with multiple sclerosis with inclusion criteria, referred to [Hazrat Rasool Akram Hospital](#) and a private referral center for multiple sclerosis patients (from 21 September 2020 to 19 January 2021) were selected by continues sampling method to participate in the study. They were assigned as two groups, intervention and control ones, using the Sealed envelope randomized online site which randomly divided to single up to quintuple blocks, which allocated equally in intervention and control groups. After providing a description of objectives and methods of the study, the informed written consent (for those who were invited to study by phone was sent and completed electronically) was completed by the participants. Data collection tools were demographic profile form and intimacy and sexual activity questionnaire for multiple sclerosis patients (MSISQ-19), which were completed three times before, immediately after training (4 weeks after the start of the study) and after the follow-up period (12 weeks after the start of the study) completed. The second and third times of completing the questionnaires were electronic. After completing the questionnaires for the first time, multimedia HPL training with multimedia in 4 sessions of 40 minutes, one session per week was provided for the intervention group. During the training and follow-up period, the researcher answered the participants' questions during a telephone call and providing a brief description of the training on the topic of that week. Data analysis is done by using descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency and percentage) and with independent t-test, chi-square, analysis of covariance and analysis of variance with repeated measures RM using SPSS software v. 16.

Results

Independent t-test results showed pre-intervention between sexual function scores ($P=0.690$) and all its dimensions (primary $P=0.117$; secondary $P=0.053$; tertiary $P=0.287$) there was no significant difference between the two groups. The results of analysis of variance with repeated measures showed that the scores of sexual function ($P=0.431$) and all its dimensions (primary $P=0.362$, secondary $P=0.915$; tertiary $P=0.168$). There was no significant difference in time in the control group. But in the intervention group, sexual function scores ($P<0.001$) and primary dimensions ($P=0.003$) and secondary ($P<0.001$) had a significant difference in at least one of the times. The results of Bonferroni correction test showed that the scores of sexual dysfunction in primary, secondary and total scores of sexual function in 4 weeks and 12 weeks after the intervention were significantly lower than before ($P<0.050$). There was no statistically significant difference between 4 weeks and 12 weeks after the intervention ($P>0.050$). To evaluate the effect of the intervention, Partial η^2 was used, which according to Cohen's classification is considered as small (0.01), medium (0.06) and high (0.14) effect. The effect size of sexual function was equal to 0.143 and the maximum effect on sexual function was in the secondary dimension (0.216) and the lowest effect was in the primary dimension of sexual function (0.105). The results of analysis of covariance showed that sexual dysfunction in the primary dimension ($P=0.019$) in the intervention group in 4 weeks after the intervention and sexual function in the secondary dimension 4 weeks after the intervention ($P=0.026$) and 12 weeks later in the intervention group ($P=0.013$) was significantly lower than the control group. But there was no significant difference between the scores of tertiary sexual function at 4 weeks ($P=0.249$) and at 12 weeks ($P=0.089$) between the two groups. The total score of sexual function 4 weeks after the intervention ($P=0.014$) and 12 weeks after the intervention ($P=0.021$) in the intervention group was significantly lower than the control group.

The results of covariance test showed that before the intervention, there was a significant difference between the two groups in the sexual dysfunction ($P<0.001$). Many items of female sexual function in the intervention group immediately after the intervention and the follow-up period improved. In the initial dimension of intervention in items with late orgasm, the intensity or low pleasure of orgasm was significant and the highest effect was related to the item of late orgasm (0.176). In the secondary dimension, intervention in pain or burning items, intestinal problems, urinary problems, concentration, memory and thinking problems were significant and the highest effect was related to body pain or

burning items (0.152). There was no difference between the groups in the third dimension

Dissection

According to the findings of this study, HPL education affects the sexual function of women with multiple sclerosis. Therefore, a HPL can be a good way to improve the sexual problems of these women. Training in this study was done using multimedia, which was cost-effective and cost-effective compared to face-to-face methods, and was considered a safe method, especially in the context of the study due to the presence of the corona epidemic. Due to the possibility of repeated use of education at the desired times and places and places have a high impact on the limited time of the study, due to the simultaneous use of multimedia and engaging multiple senses of the body in education, learning faster, deeper and easier wetness and durability has had a greater effect on the learner than what has been learned. It is recommended that physicians, midwives and other sexual health therapists use this method, which is low cost and does not require patient traffic and can be used at any time and place. Officials and therapists of the Multiple Sclerosis Association can use this method along with other methods to reduce the sexual problems of these patients. The absence of the spouses of the women participating in the study and their lack of education, which can be an obstacle to effective communication between the couples, is a limitation of the study to evaluate the sexual function of women with multiple sclerosis.

Ethical Considerations

Ethical permission for this study has been obtained from the ethics committee of [Iran University of Medical Sciences](#) with the code IR.IUMS.REC.1399.367 and has been registered in the Iranian Clinical Trial Center (IRCT2016061528449N4).

Funding

All authors contributed equally in preparing all parts of the research.

Authors' contributions

Research and article writing: Masoumeh Khairkhah and Azadeh Ahadi; Doing statistical affairs of the research: Najmeh Tavakol; Sampling: Massoud Nabavi and Lotfi.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

Researchers from the Vice Chancellor for Research and Postgraduate Studies of [Iran University of Medical Sciences](#) and officials of the School of Nursing and Midwifery of [Iran University of Medical Sciences](#), all women participating in the study, all officials and staff of [Rasool Akram Hospital](#), especially internal neurology clinic We thank the private neurology clinic located in Tehran and all those who helped us in this research.

مقاله پژوهشی

اثر آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس

*معصومه خیرخواه^۱, آزاده احمدی^۲, سید مسعود نبوی^۲, نجمه توکل^۳, طبیه لطفی^۴

جیکیده

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰ مهر

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱ اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱ اردیبهشت

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس شایع‌ترین بیماری عصبی پیشرونده در جوانان بوده و زنان را چندین برابر مردان در گیر می‌کند. مشکلات جنسی از شایع‌ترین علائم بیماری در زنان مبتلا بوده که تأثیر زیادی بر روابط زوجین دارد و اغلب نادیده گرفته می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.

روش پژوهش: مطالعه حاضریک پژوهش کارآزمایی کنترل شده تصادفی از نوع قبل و بعد با گروه کنترل است. ۱۱۶ زن با مولتیپل اسکلروزیس از مراجعین بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و یک مرکز خصوصی ارجاع بیماران مولتیپل اسکلروزیس، به روش نمونه‌گیری مستمر جهت شرکت در مطالعه انتخاب و با استفاده از سایت Sealed envelope randomized Online تاثیش تابی در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. ایزار جمع‌آوری داده‌ها فرم مشخصات فردی و پرسشنامه صمیمیت و فعالیت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود. پس از نوبت اول تکمیل پرسشنامه‌های آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت به شکل چندرسانه‌ای در چهار جلسه چهل دقیقه‌ای، هفت‌تایی یک جلسه جهت گروه آزمایش ارائه شد. تحلیل داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و آمار استنباطی با آزمون‌های آماری تی مستقل، کای دو، آنالیز کوواریانس (آنکووا) و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری به کمک نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها قبل از مداخله دو گروه از نظر نمرات عملکرد جنسی و ابعاد آن اختلاف معناداری نداشتند ($P=0.690$). میانگین عملکرد جنسی در گروه آزمایش در چهار هفته ($P=0.014$) و دوازده هفته بعد از مداخله ($P=0.021$) نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشت، اما بین نمرات چهار هفته و دوازده هفته بعد از مداخله اختلاف معنادار آماری مشاهده نشد ($P>0.50$).

نتیجه‌گیری: آموزش سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس تأثیر دارد و این آموزش می‌تواند روش مناسبی برای بهبود مشکلات جنسی این زنان باشد.

کلیدواژه‌ها:

مولتیپل اسکلروزیس،
عملکرد جنسی، سبک
زنده‌گیری ارتقادهنه
سلامت

۱. گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
۲. گروه مغز و علوم شناختی، موسسه زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی رویان، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
۳. مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش پورسینای حکیم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
۴. مرکز توسعه تحقیقات بالینی رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول:

معصومه خیرخواه

نشانی: گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

تلفن: +۹۸ (۰۹۱۲) ۴۷۸۷۶۹۱

ایمیل: kheirkhah.m@iums.ac.ir

مقدمه

ارگاسم) و رطوبت واژن می‌شود؛ مشکلات جنسی ثانویه که به دلیل تأثیر تغییرات فیزیکی مربوط به بیماری بروز پیدا می‌کند و به صورت غیرمستقیم، پاسخ جنسی را تخریب می‌کند، شامل مسائلی همچون ضعف یا گرفتگی عضلات، مشکلات در حرکات بدن طی فعالیت جنسی، اختلال عملکرد مثانه و روده و مشکلات مرتبط با حافظه و تمرکز^۱؛ مشکلات جنسی بعد ثالثیه، مانند تغییر تصویر بدنی، به جنبه‌های روان‌شناسی، اجتماعی و فرهنگی بیماری مولتیپل اسکلروزیس مربوط است^۲.

بیماری‌های مزمن اغلب در نتیجه شرایط زندگی ناسالم ایجاد می‌شود. توجه به منشأ این بیماری‌ها سبب توجه به سبک زندگی و رفتار انسان شده است^۳. علی‌همچون استرس و کمبود ویتامین دی^۴ را از عوامل دخیل در ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیس می‌دانند. همین‌طور، عادات غذایی و مدت قرار گرفتن در معرض نور خورشید در ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس بسیار مؤثر است^۵. همچنین حضور برخی فاکتورهای روانی با شروع بیماری مولتیپل اسکلروزیس رابطه‌ای نزدیک دارد. بین مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس و جمعیت عمومی تفاوت زیادی از نظر نحوه ارتباطات بین‌فردي و سطح اضطراب دیده شده است^۶. در زمینه سبک زندگی، بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ممکن است با مشکلات متعددی همچون شرایط استرس‌زا، رژیم غذایی ناسالم، فعالیت فیزیکی ناکافی و منابع ناکافی حمایت مواجه شوند^۷. اصلاح سبک زندگی مستلزم تغییر رفتارهایی است که بخش عمدی‌های از عادات روزمره فرد را تشکیل می‌دهد^۸. تغییر سبک زندگی با تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های زندگی همراه است و سبب نزدیکتر شدن زوج‌ها به یکدیگر می‌شود^۹. فعالیت جنسی از عوامل مختلفی همچون روابط بین‌فردي متأثر است^{۱۰} و فشارهای روانی و مدیریت استرس می‌تواند بر مشکلات جنسی مؤثر باشد^{۱۱}.

سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که فرد را در برابر بیماری‌ها و صدمات محافظت کرده و احتمال بروز صدمه و آسیب به سلامتی را کاهش می‌دهد^{۱۲}. سبک زندگی ارتقادهنه سلامت یک الگوی خودآغازگر و در کشده توسط شخص برای حفظ و ارتقای سطح تدرستی است که به وسیله خود فرد اجرا و تکمیل می‌شود^{۱۳}. سبک زندگی ارتقادهنه سلامت دارای شش مؤلفه روابط بین‌فردي، تعذیبه، فعالیت فیزیکي، مدیریت استرس، مسئولیت‌پذیری سلامت و خودشکوفایي است^{۱۴}. تغییر سبک زندگی با تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های زندگی همراه است و سبب نزدیکتر شدن زوج‌ها به یکدیگر می‌شود^{۱۵}. فعالیت جنسی از عوامل مختلفی همچون روابط بین‌فردي متأثر است^{۱۶}.

مولتیپل اسکلروزیس^۱ یک بیماری خودایمنی سیستم اعصاب مرکزی است که با التهاب مزمن، از بین رفتن (تخرب) میلین، گلیوزیس و کم شدن نرون‌ها در سیستم اعصاب مرکزی مشخص می‌شود^{۱۷} و جزء شایع‌ترین اختلالات التهابی سیستم اعصاب مرکزی است^{۱۸}. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی^۲ (۲۰۰۸) شیوع این بیماری بیست تا شصت نفر در هر صد هزار نفر و میزان ابتلای زنان سه تا چهار برابر مردان است^{۱۹}. اغلب در سنین بیست تا چهل سالگی شروع می‌شود و بزرگسالان جوان را که از حیث روابط جنسی فعال هستند، گرفتار می‌کند^{۲۰}. مطالعات نشان می‌دهند تقریباً بیشتر از نیمی از این افراد فقد زندگی جنسی رضایت‌بخش‌اند و یا رابطه جنسی آن‌ها متوقف شده است. همین‌طور ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شناس باقی ماندن فرد را در ازدواج با همان شریک نسبت به جمعیت سالم شدیداً کاهش می‌دهد^{۲۱}.

مطالعات نشان می‌دهد در بیشتر بیماران حتی در افراد با درجه ناتوانی خفیف، اختلالات ادراری و جنسی دیده می‌شود^{۲۲}. به طوری که شیوع اختلال عملکرد جنسی در این زنان حدود ۷۳ درصد است^{۲۳}. شیوع مشکلات جنسی اولیه در زنان ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از این حد نیز بیشتر و به میزان ۸۷/۱ درصد است^{۲۴} که با توجه به آمار بالای شیوع اختلال عملکرد جنسی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس، این مسئله یک نگرانی بزرگ به نظر می‌رسد^{۲۵}.

در این بیماری اختلالات قشر مغز که باعث ضعف، گرفتگی عضلات، مشکلات تکلم و آسیب در تطابق می‌شود، صمیمیت جنسی بیماران را تقلیل می‌دهد^{۲۶}. مسائل جنسی در زندگی زوجین جزء مسائل درجه یک و پراهمیت مابین زوجین است و قادر است تمامی روابط و تعاملات آنان را متأثر سازد^{۲۷}. رابطه جنسی یکی از جنبه‌های مهم روابط زوجین است که بهخصوص در این بیماران معمولاً مغفول واقع شده است. اختلال عملکرد جنسی دارای اثرات فراوان و متنوع در زندگی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است و روابط بین‌فردي و زندگی زناشویی آنان را متأثر می‌سازد^{۲۸}. در حالی که رفع نیازهای جنسی و بهداشت جنسی جزء عوامل مهم دخیل در بهداشت جسم و روان است و بر استحکام خانواده می‌افزاید^{۲۹}. مشکلات عملکرد جنسی این زنان در سه بُعد طبقه‌بندی می‌شود: مشکلات جنسی اولیه که به دلیل اثر عوارض نورولوژیک بیماری بر سیستم اعصاب مرکزی، بروز می‌کند و مستقیماً بر پاسخ‌دهی جنسی و احساسات جنسی تأثیر گذاشته و سبب مشکلاتی، مانند کاهش میل جنسی و حس ژنتال، مشکلات ارگاسم (فقدان یا تأخیر

3. Vitamin D

1. Multiple Sclerosis (MS)

2. World Health Organization (WHO)

بر این اساس، انجام مطالعاتی در زمینه عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس لازم به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقاده‌نده سلامت بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس طراحی و اجرا شد. در این مطالعه شرکت‌کنندگان با در پیش گرفتن سبک زندگی سالم (بدون نیاز به تردد به مکان خاص و یا استفاده از لوازم خاص و با اصلاح برخی رفتارهای روزمره و ملموس زندگی که امری سهل الوصول و بدون نیاز به کمک گرفتن از دیگران بود) و ارتقای سلامت خود، به کاهش برخی عوارض و مشکلات بیماری و اثرات آن‌ها بر عملکرد جنسی و درنتیجه افت اختلال عملکرد جنسی دست یافتند.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی از نوع قبل و بعد با گروه کنترل بود که بر روی ۱۱۶ زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران و یک کلینیک تخصصی مغز و اعصاب خصوصی واقع در شهر تهران، انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پس از اخذ معرفی‌نامه از دانشگاه و رائے آن به مراکز بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و کلینیک تخصصی مغز و اعصاب خصوصی منتخب و کسب اجازه کار از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و مسئول کلینیک خصوصی، نمونه‌گیری به شکل مستمر و از بین مراجعین حضوری و از طریق دسترسی به پرونده بیماران مراجع قبلی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) (بررسی پرونده بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۹ و دعوت از افراد واجد معیارهای ورود به شکل تلفنی برای شرکت در مطالعه) از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۳۰ دی ۱۳۹۹ انجام شد. حجم نمونه در سطح اطمینان ۹۵ درصد و توان آزمون ۸۰ درصد و با فرض اینکه تأثیر آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقاده‌نده سلامت، بر عملکرد جنسی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باید هفت واحد تغییر داشته باشد تا این تأثیر از نظر آماری معنادار تلقی شود، به ازای هر گروه ۵۳ نفر محاسبه شد که با در نظر گرفتن ده درصد ریزش نمونه‌ها، ۵۸ نفر در هر گروه قرار گرفتند. با توجه به عدم وجود مقاله مشابه در این باره از انحراف معیار نمونه پایلوت برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. پژوهشگر طی حضور در روزهای خاصی در محیط پژوهش، بیماران واجد معیارهای ورود به مطالعه را به شرکت در پژوهش دعوت کرد. معیارهای ورود به مطالعه شامل تابعیت ایرانی، سن ۲۰–۴۵ سال در بازه سنین باروری و فعل از نظر جنسی، گذشت بیش از شش ماه از تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیس توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب طبق درج در پرونده، داشتن نمره ناتوانی کمتر از ۵/۵ به تشخیص پزشک متخصص مغز و اعصاب بر اساس مقیاس

آموزش نقش مهمی در ارتقای سبک زندگی سالم ایفا می‌کند [۲۳]. تکنولوژی می‌تواند فرصتی برای افزایش اطلاعات و یادگیری مهارت‌های جدید باشد [۲۴] و آموزش چندرسانه‌ای یک شیوه چندجانبه و فرآگیر بدون نیاز به معلم و جلسات حضوری است که می‌تواند اطلاعات لازم برای مقابله با بیماری و تصحیح رفتارهای خودمراقبتی را به بیماران ارائه دهد [۲۵]. نمایش فیلم، در انتقال موضوعات سلامت تأثیر بسزایی دارد [۲۶]. در این روش از چندین نوع رسانه مثل متن و صدا و فیلم به شکل ترکیبی برای بیان مطلب استفاده شده است [۲۷] و به دلیل سرعت بالای انتقال اطلاعات و دسترسی بالا به کلمات، صدای و تصاویر، کیفیت آموزش بالا رفته و یادگیری بهتر می‌شود [۲۸] و با در نظر گرفتن شرایط خاص این بیماران، روش مناسبی برای آموزش این بیماران به نظر می‌آید.

آسیب‌های جسمی بیماری با تحریب تصویر ذهنی، افت همزمان فعالیت جنسی این زنان را موجب می‌شود. درد و خستگی مانع برقراری یک رابطه جنسی رضایت‌بخش و سالم می‌شود و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را محدود می‌کند. درنتیجه، زندگی جنسی این بیماران همیشه با مشکلاتی درگیر است، به طوری که این مشکلات تنفس زیادی را در زندگی زناشویی آنان ایجاد می‌کند. از آنجا که افراد با محدودیت‌های فرهنگی اجتماعی و خانوادگی زیادی در زمینه مسئله عملکرد جنسی مواجه‌اند [۲۹] و به دلیل فرهنگ محافظه‌کارانه و تابو بودن صحبت در مورد مسائل جنسی در بین بیشتر زنان ایرانی، این موضوع غالباً نادیده گرفته شده [۳۰] و از طرف بیماران مطرح نشده است. کادر درمان نیز به دلیل فرهنگ حاکم بر جامعه و یا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در این زمینه، بررسی لازم را انجام نمی‌دهند. با وجود تأثیرات زیاد و متنوع بیماری بر افت عملکرد جنسی این زنان و آمار بالای شیوع اختلال عملکرد جنسی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس این مسئله به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد [۳۱]. در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، انجام اقدامات لازم منوط به حضور بیماران در محل پژوهش بود. در حالی که مشکلات عدیدهای که این بیماری ایجاد می‌کند از جمله درد و خستگی، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را برای این زنان محدود می‌کند. به علاوه در مطالعات قبلی به نقش پیشگیرانه آموزش سبک زندگی ارتقاده‌نده سلامت، خصوصاً آموزش چندرسانه‌ای که توانایی بهره‌وری از راه دور و تکرار استفاده از محتوای آموزشی بر حسب تمایل و نیاز فراگیران را دارد، پرداخته نشده است. انجام مطالعاتی در زمینه عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس لازم به نظر می‌آید. از آنجا که آموزش، مشاوره و راهنمایی در مورد سلامت جنسی و مسائل مربوط به آن از وظایف مهم ماماهاست، ماماها می‌توانند با برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی و یا کلاس‌ها و جلسات آموزشی، موجب ارتقای آگاهی و سلامت زنان و خانواده شوند [۳۲].

- جلسه اول: مقدمه، شرحی بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس و تأثیر آن بر عملکرد؛
- جلسه دوم: آموزش در ابعاد مسئولیت‌پذیری سلامت و تعذیه؛
- جلسه سوم: آموزش در بعد روابط بین فردی؛
- جلسه چهارم: آموزش در ابعاد ورزش و خودشکوفایی و مدیریت استرس.

طی مدت آموزش و مدت پیگیری (هشت هفته پس از پایان مداخله به طول انجامید) هفتاهای یک بار پژوهشگر طی تماسی تلفنی با ارائه شرحی مختصر بر آموزش با موضوع آن هفته، به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ می‌داد. در هفته چهار و دوازده پس از آغاز مداخله، پرسشنامه‌ها به صورت الکترونیک برای شرکت‌کنندگان ارسال و توسط آنان تکمیل شد. کل زمان جمع‌آوری داده‌ها در مرحله چهار و دوازده هفته پس از آغاز مداخله هر کدام ده روز به طول انجامید که چهار روز آن به عنوان فرصت به شرکت‌کنندگان برای پر کردن و ارسال پرسشنامه مخصوص استفاده شده در این مطالعه شامل فرم مشخصات فردی و فرم مشخصات بهداشتی-پزشکی و پرسشنامه صمیمیت و فعالیت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود. فرم مشخصات فردی حاوی سؤالات مربوط به سن، سن همسر، سطح تحصیلات بیمار، سطح تحصیلات همسر، وضعیت اقتصادی، تعداد فرزندان، وضعیت مسکن، شغل و مدت ازدواج بود ([جدول شماره ۱](#))، فرم مشخصات بهداشتی-پزشکی حاوی سؤالات مربوط به داروهای مصرفی، مصرف داروهای با عوارض خاص، طول مدت ازدواج، طول مدت بیماری، عوارض بیماری، نمره ناتوانی (توسط متخصص مغز و اعصاب برای هر شرکت‌کننده تعیین شد) بود ([جدول شماره ۲](#)).

عملکرد جنسی زنان شرکت‌کننده در مطالعه توسط پرسشنامه صمیمیت و فعالیت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (نوزده سؤالی)^۱ که پایابی و اعتبار آن اولین بار توسط ساندرز^۲ و همکاران بررسی شد، در سه مرحله قبل، بعد از مداخله و هشت هفته پس از پایان مداخله ارزیابی شد ([جدول شماره ۳](#)). دارای روش نمره‌گذاری به صورت پنج گزینه‌ای لیکرت (همیشه، اغلب، گاهی، بسیار، هرگز) است که در این مقیاس به گزینه «همیشه» بیشترین امتیاز یعنی پنج و به گزینه «هرگز»، کمترین امتیاز یعنی یک تعلق می‌گیرد. حداقل نمره کسب شده در این پرسشنامه نوزده و حداً کثر نمره آن ۹۵ است. نمرات بالاتر در هر بعد نشان‌دهنده مشکلات جنسی بیشتر است. نمره هر بعد از مجموع پاسخ‌های مربوط به سؤالات همان بعد به دست می‌آید. هیچ کدام

ناتوانی^۳، داشتن سواد خواندن و نوشتن، داشتن دسترسی و مهارت استفاده از موبایل هوشمند طبق اظهار خود فرد، تأهل بیش از یک سال، داشتن رابطه جنسی حداقل یک بار در ماه، توانایی انجام امور شخصی روزانه بدون کمک دیگران طبق اظهار خود، عدم اقدام به طلاق، عدم شرکت همزمان در دوره‌های آموزشی مشابه، عدم بارداری، عدم یائسگی، عدم ابتلای همزمان به بیماری مزمن دیگر، عدم مصرف داروهای خواب‌آور، الكل، مواد مخدر طبق اظهار خود فرد، عدم مواجهه با تجربیات تنش‌زا از جمله مرگ نزدیکان طی شش ماه گذشته بود و معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل عدم تمایل به ادامه همکاری و بارداری حین مطالعه بود.

در این مطالعه پس از ارائه شرحی بر اهداف و موضوع آموزش و روش اجرای مطالعه به شرکت‌کنندگان در مطالعه توسط پژوهشگر و اطمینان دادن از اینکه اطلاعات آن‌ها محظمانه می‌ماند، نمره ناتوانی توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب تعیین شد و از افراد داوطلب شرکت در مطالعه رضایت‌نامه کتبی آگاهانه و آزادانه اخذ شد و پرسشنامه صمیمیت و فعالیت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس و فرم مشخصات فردی و فرم مشخصات بهداشتی-پزشکی توسط واجدین شرایط تکمیل شد (پرسشنامه‌ها و رضایت‌نامه کتبی برای افرادی که به صو تلفنی به مطالعه دعوت شده بودند به صورت الکترونیک از طریق نرم‌افزار [پرسشنامه آنلاین پرس لاین](#) و گاه از طریق واتس آپ^۴ ارسال و پاسخ‌ها به شکل الکترونیک دریافت شد). پژوهشگر یک شماره تلفن برای پاسخ‌گویی به سؤالات واحدهای پژوهش در اختیار شرکت‌کنندگان قرارداد. سپس شرکت‌کنندگان بر اساس [sealed envelope randomization online](#) [۳۱] و در بلوک‌های یک تا پنج‌تایی به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (۵۸ نفر در هر گروه) تخصیص داده شدند. سپس نمونه‌ها به ترتیب (بر اساس لیست به دست آمده از سایت مذکور) به مطالعه وارد می‌شدند که از این تعداد در فاصله شروع تا پایان مداخله، در گروه آزمایش سه نفر به دلیل عدم تمایل به ادامه مطالعه و یک نفر به دلیل بیماری شدید بستگان و اعلام نداشتن زمان کافی برای اقدام به توصیه‌های آموزشی مطالعه و یک نفر به دلیل ابتلا به بیماری مزمن دوم و ناتوانی در انجام محتوای آموزشی تمایلی به ادامه مطالعه نداشتند و از مطالعه خارج شدند. در گروه کنترل نیز چهار نفر به دلیل عدم تمایل به ادامه مطالعه و یک نفر به دلیل تشديد دردهای عضلاتی و ابراز ناتوانی برای ادامه انجام توصیه‌های آموزشی و شرکت در مطالعه، از مطالعه خارج شدند ([تصویر شماره ۱](#)). سپس محتوای آموزشی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت که به شکل چند رسانه‌ای آمده شده بود در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت. محتوای آموزشی شامل چهار جلسه آموزش بهطور متوسط حدود چهل دقیقه‌ای به مدت چهار هفته به شرح زیر بود:

4. Expanded Disability Status Scale
5. WhatsApp

6. Audrey Sorgen Sanders
7. The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-MSISQ 19

کوچک، ۰/۰۶ متوسط و ۱/۰ بالا در نظر گرفته می‌شود. اندازه‌های اثر در رابطه با گروه کنترل محاسبه شد (جدول شماره ۴)، در پایان پژوهش، جهت رعایت اخلاق در پژوهش، محتوای آموزشی در اختیار گروه کنترل نیز قرار گرفت.

یافته‌ها

شرکت کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر مشخصات فردی شامل میانگین سن، سن همسر، وضعیت مسکن، تعداد فرزند، شغل، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات بیمار، سطح تحصیلات همسر و مدت ازدواج تفاوت آماری معناداری نداشتند (جدول شماره ۱). شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل از نظر مشخصات پزشکی-بهداشتی شامل مصرف دارو، مصرف داروهای با عوارض و تأثیر بر عملکرد جنسی، دفعات رابطه جنسی در ماه، میزان عوارض بیماری، مدت بیماری، نمره ناتوانی، تفاوت آماری معناداری نداشتند (جدول شماره ۲).

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد قبل از مداخله بین نمرات عملکرد جنسی کل و تمامی ابعاد آن در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت آماری معناداری نبود ($P=0/050$). با توجه به فراهم بودن شرایط استفاده از آزمون کوواریانس در زمان قبل از مداخله برای بررسی اختلال عملکرد جنسی در دو گروه در زمان‌های پس از مداخله، از این آزمون استفاده شد. بر اساس نتایج آنالیز کوواریانس اختلال عملکرد جنسی در بعد اولیه در گروه آزمایش در چهار هفته بعد از مداخله به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود ($P=0/019$) و نمره عملکرد جنسی کل و نمره عملکرد جنسی در بعد ثانویه چهار هفته و دوازده هفته پس از مداخله در گروه آزمایش به صورت معناداری از گروه کنترل کمتر بود. نمره عملکرد جنسی کل و بعد از مداخله ($P=0/021$) در گروه آزمایش به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود، اما بین نمرات عملکرد جنسی بعد ثالثیه در زمان‌های چهار هفته ($P=0/0249$) و دوازده هفته ($P=0/089$) بین دو گروه اختلاف معناداری نبود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری (جدول شماره ۳) نشان داد نمرات عملکرد جنسی کل و ابعاد آن در طول زمان در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت، اما در گروه آزمایش نمره عملکرد جنسی کل ($P=0/001$)، ابعاد اولیه ($P<0/001$)، ثانویه ($P=0/003$) در حداقل یکی از زمان‌ها با هم اختلاف معناداری داشت. نتایج آزمون دوبعدی تصحیح بن فرونی^۴ نشان داد نمرات اختلال عملکرد جنسی در ابعاد اولیه، ثانویه و نمره عملکرد جنسی کل در چهار هفته و دوازده هفته بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشت ($P<0/050$ ، اما بین نمرات چهار هفته و دوازده هفته بعد از مداخله اختلاف معنادار آماری مشاهده نشد ($P>0/050$). برای مقایسه میانگین‌ها در زمان‌های

از سوالات ابزار نمره معکوس ندارد. از سوالات این پرسشنامه پنج سؤال مربوط به اختلال در بعد اولیه (سؤالات ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱)، نه سؤال مربوط به اختلال در بعد ثانویه (سؤالات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴) و پنج سؤال مربوط به اختلال در بعد ثالثیه (سؤالات ۱۵، ۱۶، ۱۷) است. پرسشنامه صمیمیت و فعالیت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس از نوع عمومی و استاندارد است که پایایی و اعتبار آن توسط ساندرز و همکاران در سال ۲۰۰۰ طی تحقیقی که به همین منظور انجام شد، بررسی شد. پایایی کلی این ابزار به روش آلفای کرونباخ^۵ ۰/۹۱ به دست آمد [۳۲]. در ایران نیز توسط محمدی و همکاران در سال ۲۰۱۴ به تأیید رسید و پایایی کلی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و ابعاد آن بیش از ۰/۷ به دست آمد [۳۳]. برای تأیید روایی، نسخه فارسی پرسشنامه در اختیار پنج نفر از اساتید قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. برای به دست آوردن پایایی، پرسشنامه فارسی در دو نوبت به فاصله چهارده روز برای تکمیل در اختیار بیست نفر از زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قرار گرفت و توسط آنان تکمیل شد و پس از وارد کردن اطلاعات به دست آمده و انجام تجزیه و تحلیل آماری و طی زمان کلی یک ماه، آلفای کرونباخ آن به دست آمد. آلفای کرونباخ پرسشنامه صمیمیت و فعالیت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در بعد عملکرد جنسی اولیه ۰/۷۷ و در بعد عملکرد جنسی ثانویه ۰/۸۳ و در بعد عملکرد جنسی ثالثیه ۰/۸۳ و نمره کل کرونباخ ۰/۸۷ و همبستگی بازآزمون برابر ۰/۸۸ بود. افرادی که برای گرفتن پایایی ابزار در مطالعه همکاری داشتند و پرسشنامه را تکمیل کردند در مطالعه اصلی حضور نداشتند.

برای توصیف متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و توصیف متغیرهای کیفی از جداول توزیع فراوانی استفاده شد. با پیش‌فرض نرمال بودن داده‌ها تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون‌های کای دو^۶، تی مستقل^۷ انجام شد. آنالیز کوواریانس^۸ و تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری یک‌طرفه^۹ و با استفاده از نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS انجام شد. برای مقایسه میانگین‌ها در زمان‌های پس از مداخله، با توجه به برقراری پیش‌فرض‌های آنالیز کوواریانس (همگنی واریانس‌ها، نرمال بودن باقی‌مانده‌ها، همسانی واریانس‌ها، همگنی شبیه رگرسیون، معنادار بودن اثر نمره پیش‌آزمون به عنوان اثر انتقال در آزمون کوواریانس) از این آزمون استفاده شد. در این مطالعه $P<0/050$ سطح معناداری محسوب شد. برای بررسی اثر مداخله از ابزار اندازه اثر^{۱۰} استفاده شد که بر اساس تقسیم‌بندی کوهن [۳۴] مقدار ۰/۰۱ اندازه اثر

8.Cronbach's alpha


9. Chi-squared test

10. Independent t-test

11. Analyze of Covariance (ANCOVA)

12. One-way Repeated Measures Analysis of Variance

13. Partial eta-Squared



تصویر ۱. نمودار کانسورت

شد که بر اساس تقسیم‌بندی کوهن^{۱۵} [۳۴] مقدار ۱۰/۰ اندازه اثر کوچک، ۰/۰۶ متوسط و ۰/۰۱۴ بالا در نظر گرفته می‌شود. اندازه اثر عملکرد جنسی کل ۰/۱۴۳ و بیشترین اندازه اثر در عملکرد جنسی در بعد ثانویه ۰/۲۱۶ و کمترین اثر در بعد اولیه عملکرد جنسی ۰/۱۰۵ بود.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد آموزش چندسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت، اثربخشی معناداری در بهبود عملکرد جنسی کل در زنان با مولتیپل اسکلروزیس در گروه آزمایش در چهار و دوازده هفته بعد از شروع مداخله داشته است، نمره کل

پس از مداخله، با توجه به برقراری پیش‌فرض‌های آنالیز کواریانس از این آزمون استفاده شد. بسیاری از گویه‌های عملکرد جنسی زنان در گروه آزمایش بلافاصله پس از مداخله و دوره پیگیری ارتقا یافته بودند. در بعد اولیه مداخله، در گویه‌های دیر رسیدن به ارگاسم، شدت یا لذت کم ارگاسم تفاوت معنادار بود و بیشترین میزان اثر مربوط به گویه دیر رسیدن به ارگاسم (۰/۱۷۶) بود. در بعد ثانویه مداخله در گویه‌های درد یا سوزش بدن، مشکلات روده‌ای، مشکلات ادراری، مشکلات تمرکز، حافظه و تفکر معنادار بود. بیشترین میزان اثر مربوط به گویه درد یا سوزش بدن (۰/۱۵۲) بود. در بعد ثالثیه تفاوتی بین گروه‌ها مشاهده نشد. چنانکه گفته شد برای بررسی اثر مداخله از ابزار اندازه اثر استفاده

جدول ۱. مقایسه فراوانی و درصد شاخص‌های عددی مشخصات فردی زنان با مولتیپل اسکلروزیس در دو گروه آزمایش و کنترل (۵۳ نفر)

نتایج آزمون	تعداد (درصد) / میانگین ± انحراف معیار		گروه	مشخصات جمعیتشناختی
	آزمایش	کنترل		
$t=+0.287$ $df=104$ $P=0.775$	۱۰(۱۸/۹) ۳۲(۶۰/۴) ۱۱(۲۰/۸) ۳۶/۱۷±۵/۵۳	۸(۱۵/۱) ۳۲(۶۰/۴) ۱۳(۳۴/۵) ۳۵/۸۷±۵/۳۱	۳۰ و کمتر ۴۰-۳۱ بیشتر از ۴۰	سن (سال)
$X^2=1/119$ $df=2$ $P=0.148$	۲۵-۴۵	۲۵-۴۵	بیشینه - کمینه	
$t=-0.385$ $df=104$ $P=0.700$	۱۰(۱۸/۹) ۲۷(۵۰/۹) ۱۶(۳۰/۲) ۴۰/۵۳±۷/۰۵	۵(۷/۴) ۳۰(۵۶/۶) ۱۱(۲۰/۸) ۴۰-۲۴±۶/۵۱	۵ ۵-۱۰ بیشتر از ۱۰	مدت ازدواج (سال)
$X^2=1/364$ $df=2$ $P=0.506$	۲۵-۴۵	۳۱(۵۸/۵)	مالک	
$X^2=0.504$ $df=1$ $P=0.497$	۲۹(۵۴/۷) ۲۴(۴۵/۳)	۲۵(۴۷/۲) ۲۸(۵۲/۸)	دیلهم و کمتر بالاتر از دیلهم	**تحصیلات
$X^2=0.009$ $df=1$ $P=0.926$	۲۷(۵۱/۹) ۲۵(۴۸/۱)	۲۸(۵۲/۸) ۲۵(۴۷/۲)	دیلهم و کمتر بالاتر از دیلهم	**تحصیلات همسر
$X^2=1/485$ $df=1$ $P=0.223$	۳۵(۸۴/۹) ۸(۱۵/۱)	۴۰(۷۵/۴) ۱۳(۲۴/۵)	خانهدار شاغل	شغل
$X^2=0.796$ $df=2$ $P=0.416$	۷(۱۲/۲) ۲۷(۵۰/۹) ۱۹(۳۵/۸)	۱۴(۲۶/۴) ۳۲(۶۰/۴) ۷(۱۳/۲)	مطلوب متوسط نامطلوب	وضعیت اقتصادی
$X^2=0.387$ $df=2$ $P=0.68$	۱۷(۳۲/۱) ۱۵(۲۸/۳) ۲۱(۳۹/۶)	۷(۱۳/۲) ۱۹(۳۵/۸) ۱۷(۵۰/۹)	بدون فرزند یک فرزند دو تا سه فرزند	تعداد فرزند

متغیر مستقل / **کای دو

نشریه پرستاری ایران

از گروه کنترل کمتر بود که بیانگر بهبود عملکرد جنسی کل و عملکرد جنسی در بعد ثانویه در چهار و دوازده هفته پس از شروع مداخله در گروه آزمایش بود. بر اساس یافته‌های مطالعه، آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت موجب بهبود معنادار در بعد اولیه عملکرد جنسی در چهار هفته بعد از شروع مداخله و ارتقای بعد ثانویه عملکرد جنسی در زمان‌های چهار و دوازده هفته بعد از شروع مداخله شد.

عملکرد جنسی چهار هفته بعد از مداخله ($P=0.14$) و دوازده هفته بعد از مداخله ($P=0.21$) در گروه آزمایش بهصورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود. اختلال عملکرد جنسی در بعد اولیه در گروه آزمایش در چهار هفته بعد از مداخله بهصورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود ($P=0.19$) و نمره عملکرد جنسی کل و نمره عملکرد جنسی در بعد ثانویه چهار هفته و دوازده هفته پس از مداخله در گروه آزمایش بهصورت معناداری

جدول ۲. مقایسه فراوانی و درصد شاخص‌های عددی مشخصات پزشکی - بهداشتی زنان با مولتیپل اسکلروزیس در دو گروه آزمایش و کنترل (۵۳ نفر)

نتایج آزمون	آزمایش		گروه
	تعداد (درصد)	تعداد	
$t=+0.598$ $df=95$ $P=+0.616$	۳۰(۵۶/۶)	۲۵(۳۷/۲)	۱-۵ بار
	۱۵(۲۸/۴)	۲۰(۳۷/۷)	۶-۱۰ بار
	۶(۱۱/۳)	۱(۱/۹)	بیشتر از ۱۰ بار
	۵۱(۹۶/۲)	۴۶(۸۶/۸)	جمع
	$۵/۷۵\pm ۳/۷۹$	$۵/۲۸\pm ۳/۸۰$	میانگین \pm انحراف معیار
$\chi^2=+0.001$ $df=1$ $P=+0.999$	(۱-۲۲)	(۱-۲۵)	بیشینه - کمینه
	۵۰(۹۴/۴)	۵۰(۹۴/۴)	بله
	۳(۵/۷)	۳(۵/۷)	خیر
$\chi^2=+0.164$ $df=1$ $P=+0.685$	۲۲(۴۴)	۲۰(۴۰)	بله
	۲۸(۵۶)	۳۰(۶۰)	خیر
	$۴۲(۷۹/۲)$	$۴۶(۸۶/۸)$	خفیف
$\chi^2=+0.071$ $df=1$ $P=+0.301$	۱۱(۲۰/۸)	۷(۱۲/۲)	متوسط
	$۴۲(۷۹/۲)$	$۴۷(۸۸/۷)$	-۲
	۱۱(۲۰/۸)	۶(۱۱/۳)	۲-۴
$\chi^2=+1.751$ $df=1$ $P=+0.185$	۵(۹/۳)	۱۱(۲۰/۸)	۱-۶ ماه
	۱۳(۲۴/۵)	۱۴(۲۶/۹)	۱-۵
	۲۶(۴۹/۱)	۱۶(۳۰/۲)	۵-۱۰
	۹(۱۷/۰)	۱۲(۲۲/۶)	بیشتر از ۱۰
	** مستقل / ** کای دو		

نشریه پرستاری ایران

جنسي، مرطوب شدن واژن، ارگاسم، رضایتمندی جنسی و درد جنسی شد که با مطالعه حاضر مشابه و هم خوان بود.

در مطالعه دانش فر و همکاران [۳۵] که مطالعه‌ای مداخله‌ای با عنوان «تأثیر مشاوره مدل پلی سیت بر فعالیت جنسی زنان ازدواج کرده با مولتیپل اسکلروزیس» بود و با ۱۲۰ زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن بیماران مولتیپل اسکلروزیس تهران با استفاده از پرسشنامه فعالیت و صمیمت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر تهران انجام شد، مداخله باعث بهبود فعالیت جنسی شد. در مطالعه داس گویتا^{۱۰} و همکاران [۳۶] که مطالعه‌ای نیمه تجربی و دوسوکور با عنوان «تأثیر سیلندا فیل بر میزان اختلال عملکرد جنسی مربوط به مولتیپل اسکلروزیس» بود، ۱۹ زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که مراجعین به بیمارستان ملی نزولوژی و نوروسلولوژی لندن بودند به روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از پرسشنامه

با توجه به ارتقای گویه‌های متعدد عملکرد جنسی در گروه آزمایش، می‌توان از آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت جهت بهبود عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس بهخصوص در زمینه بهبود مشکلات دیررسیدن به ارگاسم، شدت یا لذت کم ارگاسم، مشکلات ادراری و روده‌ای و مشکلات تمرکز و حافظه و درد و سوزش بدن حین رابطه استفاده کرد. این در حالی است که در گروه کنترل، عملکرد جنسی کل و تمامی ابعاد آن در چهار و دوازده هفتۀ بعد از شروع مداخله نسبت به قبل از شروع مداخله و نسبت به هم تفاوت معناداری نداشت.

در مطالعه اسدیبور و همکاران [۱۰] اثر مداخله زوج درمانی هیجان محور بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس بر روی سی نفر زن عضو انجمن بیماران مولتیپل اسکلروزیس تهران با روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از پرسشنامه عزت نفس جنسی^{۱۱} و پرسشنامه عملکرد جنسی زنان^{۱۲} انجام شد، منجر به ارتقای عملکرد جنسی و گویه‌های میل جنسی، تحریک

جدول ۳. شاخص‌های عددی عملکرد جنسی زنان با مولتیپل‌اسکلروزیس قبل، چهار و دوازده هفته بعد از مداخله در گروه کنترل و آزمایش و مقایسه آن‌ها (۵۳ نفر)

اندازه اثر	نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری	میانگین ± انحراف معیار				زمان مداخله-گروه	عملکرد جنسی و بعد آن (۱۰۰ - +)
		دوازده هفته بعد	چهار هفته بعد	قبل از مداخله			
۰/۰۱۹	F=۱/۰۲۷ P=.۴۶۲/	۳۱/۹۰±۲۳/۲۴	۳۵/۲۱±۲۴/۱۱	۳۱/۲۹±۲۸/۰۳	کنترل	اولیه	آزمایش
۰/۱۰۵	F=۶/۱۲۱ P=.۰۰۳	۳۱/۲۲±۲۷/۳۰	۳۱/۳۲±۲۳/۷۶	۳۹/۵۹±۲۶/۰۷			
۰/۰۰۲	F=۰/۸۱۹ P=.۹۱۵	۲۱/۳۸±۱۹/۴۵	۲۱/۹۵±۲۰/۰۶	۲۰/۹۱±۱۹/۰۱	کنترل	ثانویه	آزمایش
۰/۲۱۶	F=۱۴/۲۶۰ P>۰/۰۰۱	۱۷/۷۱±۱۸/۶۶	۱۹/۶۱±۱۸/۶۴	۲۸/۳۳±۲۰/۰۱			
۰/۰۳۴	F=۱/۸۱۲ P=.۱۶۸/	۲۳/۶۰±۲۰/۴۴	۲۲/۱۶±۲۰/۳۴	۱۹/۳۸±۱۹/۹۵	کنترل	ثالثیه	آزمایش
۰/۰۰۸	F=۰/۴۳۶ P=.۶۶۱	۲۱/۸۲±۲۱/۶۳	۲۲/۷۰±۲۰/۸۳	۲۴/۱۵±۲۵/۵۰			
۰/۰۱۶	F=۰/۸۴۸ P=.۰۹۳۱	۲۵/۶۹±۱۸/۶۶	۲۶/۴۹±۲۰/۰۳	۲۳/۸۶±۱۷/۶۹	کنترل	عملکرد جنسی	آزمایش
۰/۱۴۳	F=۷/۶۹۹۳ P>۰/۰۰۱	۲۳/۶۹±۱۹/۴۱	۲۴/۵۴±۱۹/۵۶	۳۰/۶۹±۲۰/۴۲			
	F=۰/۴۵۷ P=.۰۲۱۰		F=۶/۲۵۷ P=.۰۱۳۰	t=۱/۸۳۹ df=۱۰۴ P=.۰۸۹۰	نتایج آزمون		

*تی مستقل / **آنالیز کوواریانس

نشریه پرستاری ایران

مطالعه مصلی نژاد و همکاران [۳۸] که مطالعه‌ای از نوع تصادفی کنترل شده بود در یاسوج با عنوان «رزیابی اثر ترکیبی تمارین عضلات کف لگن و ذهن‌آگاهی بر زنان با مولتیپل‌اسکلروزیس» و ۷۰ زن مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس عضو انجمن بیماران خاص یاسوج انجام شد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاکی از ارتقای نمره کلی عملکرد جنسی و گویه‌های آن بود که با مطالعه حاضر همسوست. در این مطالعه ورزش‌های لگنی موجب افزایش ضخامت و توان عضلات کف لگن شده و خور رسانی این ناحیه را افزایش داده است. همچنین تحریک‌پذیری جنسی را افزایش و ارگاسم بهتری را موجب شده است [۳۸]. در مطالعه حاضر نیز انجام تمارین ورزشی لگنی که جزئی از آموزش این مطالعه بود به بهبود تأخیر و کاهش لذت ارگاسم کمک کرده است. به علاوه موجب کاهش مشکلات ادراری و روده‌ای شرکت‌کنندگان شد.

مطالعه آهانی و همکاران [۳۹] که مطالعه‌ای از نوع مداخله‌ای و با عنوان «تأثیر مداخله آموزش ذهن‌آگاهی بر ارتقای عملکرد جنسی زنان با مولتیپل‌اسکلروزیس» بود بر روی ۴۷ زن مبتلا

عملکرد جنسی^{۱۹} و پرسشنامه گزارش فعالیت جنسی^{۲۰} در کشور انگلستان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه بهبود رطوبت واژن در شرکت‌کنندگان حاصل شد که از این حیث با نتایج مطالعه حاضر مشابه نداشت. به نظر می‌رسد علت این تفاوت، عدم مصرف داروهای مؤثر بر عملکرد جنسی در مطالعه حاضر بود. مطالعه لوسيو^{۲۱} و همکاران [۳۷] که مطالعه‌ای تصادفی و کنترل شده با عنوان «تأثیر تمارین ورزشی عضلات کف لگن بهنهایی و یا با ترکیب تحریک‌کنتریکی بر درمان اختلالات جنسی در زنان با مولتیپل‌اسکلروزیس» بود با تعداد نمونه سی زن مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس انجام شد. نمونه‌ها مراجعتین کلینیک نرولوزی دانشگاه کمپیناس^{۲۲} بودند به روش نمونه‌گیری مستمر انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان در کشور بزریل مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه حاکی از ارتقای رطوبت واژن، برانگیختگی، رضایت جنسی و نمره کلی عملکرد جنسی بود که از حیث ارتقای نمره کلی عملکرد جنسی با نتایج مطالعه حاضر مشابهت و هم خوانی داشت.

19. Sexual function Questionnaire

20. Sexual Activity Logs

21. A C Lúcio

22. Estadual de Campinas

جدول ۴. جدول اثر زمان، اثر گروه و اثر متقابل زمان و گروه در عملکرد جنسی و ابعاد آن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اثر گروه	اثر زمان	اثر متقابل زمان و گروه	اثر	
			عملکرد جنسی	ابعاد آن
F=0/0.79 P=0/0.80	F=1/0.88 P=0/0.89	F=4/0.74 P=0/0.8	اولیه	
F=0/0.21 P=0/0.86	F=0/0.12 P=0/0.06	F=6/0.99 P=0/0.01		ثانویه
F=0/0.39 P=0/0.556	F=1/0.82 P=0/0.81	F=3/0.95 P=0/0.34	ثالثیه	
F=0/0.79 P=0/0.79	F=1/0.52 P=0/0.45	F=6/0.66 P=0/0.01		عملکرد جنسی

نشریه پرستاری ایران

هامیلتون^{۲۵} و مقیاس کیفیت زندگی بی اختیاری ادرار^{۲۶} انجام شد و بهبود علائم ادراری و متغیرهای اورودینامیک را موجب شد.

در مطالعه میلتا^{۲۷} و همکاران^[۴] که مطالعه‌ای موردي با عنوان «درمان چندگانه اختلال عملکرد جنسی، درد پرینه و حذف اختلال عملکرد آن» بود و در آن یک نفر زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان در شهر تورین در کشور ایتالیا، با روش نمونه‌گیری گزارش موردي انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه‌های عملکرد جنسی زنان و بررسی کیفیت زندگی زنان^{۲۸} مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه نمره کلی عملکرد جنسی ارتقا یافت و با نتایج مطالعه حاضر هم خوانی و مشابهت داشت. نتایج مطالعات مذکور بیانگر ارتقای عملکرد جنسی زنان تحت مطالعه در همه ابعاد بود، اما در مطالعه حاضر، در عملکرد جنسی زنان در بعد اولیه و در بعد ثانویه و عملکرد جنسی کل، ارتقا مشاهده شده است. به نظر می‌رسد تفاوت‌ها ناشی از طولانی تر بودن زمان مداخله در مطالعات مذکور و استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان در مطالعات مذکور و تفاوت نوع مداخله باشد، به طوری که دارو و روش‌های درمانی در مطالعات مذکور به کار برده شده است. در حالی که مطالعه حاضر بدون استفاده از دارو و درمان خاصی صرفاً با تغییر سبک زندگی توانسته منجر به ارتقای عملکرد جنسی زنان تحت مطالعه شود.

در مطالعه قاسمی و همکاران^[۴۱] که مطالعه‌ای تصادفی و کنترل شده بود و با عنوان «تأثیر بسته ارتقای مطالعه آنها بر زندگی جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس» بر پایه نتایج مطالعات با روش‌های ترکیبی طراحی شده بود، ۷۲ زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضوانجمن بیماران مولتیپل اسکلروزیس تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان و پرسشنامه فعالیت و صمیمت جنسی بیماران مولتیپل اسکلروزیس^{۲۹} و پرسشنامه افسردگی

به مولتیپل اسکلروزیس عضوانجمن اماس اصفهان و مراجعین بیمارستان کاشانی اصفهان انجام شد. نمونه‌های روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان در شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که عملکرد جنسی کل و ابعاد آن ارتقا یافت که با نتایج مطالعه حاضر مشابهت داشت. طولانی تر بودن زمان مداخله و زمان هر جلسه آموزشی و متفاوت بودن محتوای آموزش از تفاوت‌های مطالعه‌آهانی با مطالعه حاضر بود.

در هر دو مطالعه مصلی‌نژاد و آهانی به دلیل استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان، امکان سنجش اختلال عملکرد جنسی در سه بعد اولیه و ثانویه و بعد ثالثیه وجود نداشته است و داشتن اختلال عملکرد جنسی جزو معیارهای ورود به مطالعه بود. اما مطالعه حاضر با وجود زمان کوتاه‌تر مداخله و جلسات آموزشی، به دلیل دارا بودن خصوصیت چندرسانه‌ای آموزش که یادگیری را سریع تر و عمیق تر و امکان استفاده هم‌زمان تعداد زیاد شرکت‌کنندگان از آموزش رافراهم می‌کند و داشتن تماس تلفنی هفتگی پژوهشگر جهت ارائه خلاصه آموزش و پاسخ‌گویی به سوالات، همین‌طور وجود محتوای آموزشی متفاوت و بالاتر بودن تعداد شرکت‌کنندگان، نسبت به اغلب مطالعات با عنوان مشابه، توانسته موجب ارتقای عملکرد جنسی شرکت‌کنندگان در مطالعه و نتایج مطالعه حاضر با مطالعه جیانانتونی^{۳۰} و همکاران^[۴۰] مشابهت داشت. مطالعه آن‌ها، مطالعه‌ای نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با عنوان تزریقات داخل دتریوسوریال آنابوتولینوم توکسین A عملکرد جنسی زنان با تأثیر مولتیپل اسکلروزیس شد که مراجعین به کلینیک ارلوژی دانشگاه پروژیا بودند (رم، ایتالیا). این مطالعه با استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان و پرسشنامه میزان اضطراب هامیلتون^{۲۶} و پرسشنامه افسردگی

25.Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D_A)

26. Incontinence Quality of life (I-QOL)

27. Michela Miletta

28. Sexual Quality Of Life-Female (SQOL-F)

23. Antonella Giannantoni

24. Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)

عرض بیماری‌های افسردگی، اضطراب، مشکلات و بیماری قلبی قرار دارند. استرس با توجه به شدت و نوع آن می‌تواند تعادل زیستی فرد را به هم زند، احساسات منفی ایجاد کند و احساس خوب بودن را به مخاطره بیندازد و روابط بین فردی را دگرگون کند [۲۰]. آگاه بودن از استرس و مدیریت آن موجب کاهش احتمال بیمار شدن، بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی، بهبود عملکرده افزایش بهرهوری و خلاقیت می‌شود [۲۱]. مطالعات نشان می‌دهند تمامی افراد با یادگیری مهارت‌های ارتباطی خاص می‌توانند به بهبود روابط دست یابند [۲۲]. سبک زندگی ارتقادهنه سلامت توائیته با تقلیل و بهبود بسیاری از مشکلات جسمی و عوارض بیماری مولتیپل اسکلروزیس و ارتقا و بهبود روابط فرد با همسر و با مدیریت و کاهش اثرات جسمی و روانی استرس موجب بهبود عملکرد جنسی کلی این زنان شود. این سبک در بعد اولیه عملکرد طی رابطه جنسی، بهویژه در مرکز حین رابطه و رسیدن بدون تأخیر به ارگاسم و کسب لذت بیشتر از ارگاسم (که شایع‌ترین مشکل جنسی گزارش شده در این زنان بود) می‌تواند مؤثر باشد. همچنین در بعد ثانویه در گویه‌های متعدد بهویژه درد و سوزش بدن و مشکلات روده‌ای و ادراری مؤثر است، اما در بعد ثالثیه تأثیر معناداری نداشته که به نظر می‌رسد به علت حاکمیت شرایط پراسترس اپیدمی کرونا، نیاز به زمان طولانی تر آموزش و نیز نیاز به ارائه آموزش به همسران باشد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی آموزش برای همسران این زنان نیز در نظر گرفته شود.

در مطالعه حاضر از آموزش به شیوه چندرسانه‌ای استفاده شده است. ارائه همزمان اطلاعات با استفاده از چندین رسانه به افراد در ایجاد گووهای ذهنی و تصویری و کلامی و برقراری ارتباط بین آن‌ها و استفاده همزمان از چندین حواس کمک می‌کند و همین موضوع ارتقای یادگیری و عملکرد را به دنبال دارد [۲۳]. در این روش بدون نیاز به معلم و حضور فراگیران در مکان و شرایطی خاص، موضوعات آموزش داده می‌شود و علاوه بر ارائه اطلاعات با استفاده از رسانه متن، فیلم، صدا و تصویر، به دلیل دسترسی همزمان به آن‌ها یادگیری عمیق‌تر و راحت‌تر صورت می‌گیرد. از فواید آموزش چندرسانه‌ای می‌توان به داشتن صرفه اقتصادی اشاره کرد [۲۴]. این مداخله برای اولین بار بر روی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اجرا شده است. ارائه آموزش به صورت چندرسانه‌ای حاوی فیلم و متن و صدا و تصویر متناسب با شرایط خاص زنان با مولتیپل اسکلروزیس، از نوآوری‌های این مطالعه محسوب می‌شود.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر که تأثیر سبک زندگی ارتقادهنه سلامت را بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس نشان می‌دهد و از آنجا که جمعیت مبتلایان به بیماری مولتیپل اسکلروزیس در کشور ما روزبه روز در حال افزایش است و با در نظر گرفتن این موضوع که زنان مهم‌ترین رکن خانواده و

قرار گرفتند. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همخوانی داشت. البته در مطالعه قاسی در هر سه بعد و عملکرد کل، ارتقای عملکرد جنسی مشاهده شد. به نظر می‌رسد در مطالعه قاسی داشتن اختلال عملکرد جنسی جزو معیارهای ورود به مطالعه بوده و آموزش برای افراد بر حسب نیازمنجی قبل از مطالعه ارائه شده است. این مطالعه با توجه به گستردگی و متنوع بودن موضوعات آموزش (شامل آموزش حفظ وضعیت مناسب طی رابطه جنسی، بررسی کاهش درد و سختی عضلاتی و اثر بی‌اختیاری ادرار بر رابطه جنسی، تمرین کل و آناتومی و فیزیولوژی اندام باروری، سیکل چرخه جنسی، حل مسئله، لذت از مراحل مختلف رابطه جنسی نه فقط لذت بردن از ارگاسم، استفاده مناسب از مرتبط کننده واژن، مراجعت به موقع به پزشک و مشاور و پیگیری و کسب اطلاعات لازم در زمینه مشکلات جنسی) توائیته به ارتقای عملکرد جنسی و تمامی ابعاد آن منجر شود.

در تبیین یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان گفت محتوای آموزش چندرسانه‌ای مطالعه حاضر، آموزش داشتن تغذیه سالم، بهویژه مصرف ویتامین‌های گروه ب (آموزش داده شده در مطالعه حاضر)، به ارتقای عملکرد عصب این بیماران کمک کرده و موجب بهبود تأخیر در ارگاسم و کاهش شدت و لذت ارگاسم شده است. در افراد سالم داشتن تغذیه سالم، مصرف مغزها، سبزیجات و میوه‌ها، دریافت روزانه آب و مایعات کافی می‌تواند موجب کاهش یبوست شود [۲۵]. نتایج مطالعه حاضر نشان داد داشتن تغذیه سالم به همراه مصرف آب کافی به بهبود عملکرد روده‌ای زنان با مولتیپل اسکلروزیس منجر می‌شود.

تمرینات ورزشی با برطرف کردن گرفتگی عضلات مثانه و بالا بردن ظرفیت مثانه، تکرر ادرار را کاهش داده و به برقراری خواب منظم و مداوم شبانه کمک می‌کند. ورزش‌های کششی بهویژه کشش اندام‌های تحتانی، گرفتگی عضلات را از بین می‌برد و انعطاف‌پذیری بدن را افزایش می‌دهد [۲۶]. ورزش‌های لگنی (آموزش داده شده در مطالعه حاضر) باعث افزایش توان عضلات کف لگن شده، حساسیت واژن طی رابطه جنسی را ارتقا می‌دهد و خون‌رسانی ناحیه تناسلی را بهبود می‌بخشد و با ارتقای عملکرد عصب موجب بیشتر شدن تحریک‌پذیری جنسی و انقباضات ریتمیک ارگاسم می‌شود. اجرای حرکات ورزشی در این مطالعه موجب کاهش مشکلات ادراری شرکت‌کنندگان شد. بنابراین در گویه‌های بسیاری همچون تأخیر ارگاسم و شدت و لذت ارگاسم و مشکلات ادراری و روده‌ای، سوزش و درد بدن، تمرکز، حافظه و تفکر در مرحله چهار و دوازده هفته پس از شروع مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار بود.

بررسی‌ها حاکی از آن است که هفتاد تا هشتاد درصد بیماری‌های جسمی ناشی از تنفس و نگرانی است و افرادی که بیشترین میزان استرس را در زندگی خود تجربه می‌کنند در

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده‌گان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

تحقیقین از معاونت پژوهشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه علومپزشکی ایران و مسئولان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علومپزشکی ایران، تمامی بانوان شرکت‌کننده در پژوهش، تمامی مسئولین و پرسنل **بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)**، بهویژه پرسنل درمانگاه داخلی مغز و اعصاب، کلیه مسئولین و پرسنل کلینیک خصوصی مغز و اعصاب واقع در شهر تهران و تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌کنند.

جامعه محسوب می‌شوند و مسائل جنسی در روابط زوجین نقش مهمی دارد، آموزش برای بهبود مشکلات جنسی این زنان به شکل یک نیاز بهداشتی بالاهمیت برای این جامعه مطرح است. بنابراین می‌توان به ماماها، پزشکان و روانشناسان حوزه سلامت جنسی و مسئولین و درمانگران انجمن امراض توصیه کرد که از این روش آموزشی در کنار سایر روش‌ها جهت بهبود عملکرد جنسی این زنان، بهویژه مشکلات ارگاسم و مشکلات ادراری و روده‌ای طی رابطه جنسی که جزو شایع‌ترین مشکلات هستند، استفاده کنند. این روش به دلیل عدم نیاز به تردد بیماران و قبل استفاده بودن در زمان و مکان دلخواه بیماران، مناسب شرایط این بیماران به نظر می‌رسد. عدم شرکت همسران زنان مبتلا در مطالعه و عدم آموزش آنان، مانعی در برقراری ارتباط مؤثر زوجین می‌توانست باشد که از محدودیت‌های این مطالعه است. بنابراین توصیه می‌شود در مطالعات بعدی همسران شرکت‌کننده‌گان نیز آموزش‌های لازم را دریافت کنند و نقش آموزش همسران در ارتقای عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس برسی شود.

آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت بر عملکرد جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس تأثیر داشت. بنابراین سبک زندگی ارتقادهنه سلامت می‌تواند روش مناسبی برای بهبود مشکلات جنسی این زنان باشد. آموزش چندرسانه‌ای سبک زندگی ارتقادهنه سلامت توانست در زنان دارای مشکلات ارگاسم، مشکلات ادراری، روده‌ای، درد و سوزش بدن حین رابطه مفید باشد و به ارتقای عملکرد جنسی آنان منجر شود که در بهبود روابط با همسر نیز تأثیر مثبت داشت. بنابراین استفاده از این بسته آموزشی چندرسانه‌ای به مسئولان و متخصصان در نظام سلامت برای بانوان با مولتیپل اسکلروزیس توصیه می‌شود.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

مجوز اخلاقی برای این مطالعه از کمیته اخلاق دانشگاه علوم‌پزشکی ایران با کد IR.IUMS.REC.1399.367 گرفته شده است و در مرکز کارآزمایی باليي ايران (IRCT2016061528449N4) ثبت شده است.

حامي مالي

این پژوهش هیچ‌گونه کمک مالی از سازمانی‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندهان

تحقيق و نوشتمن مقاله: معصومه خیرخواه و آزاده احمدی؛ انجام امور آماری پژوهش: نجمه توکل؛ نمونه‌گیری: مسعود نبوی و لطفی

References

- [1] Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. *Harrison's principles of internal medicine*. New York: McGraw-Hill Education; 2018. [\[Link\]](#)
- [2] Zarabadipour S, Amini L, Nabavi SM, Haghani H. [Menstrual disorders and related factors in women with multiple sclerosis (Persian)]. *Iran J Obstet Gynecol Infertil.* 2018; 21(4):43-52. [\[DOI:10.22038/IJOGI.2018.11226\]](#)
- [3] World Health Organization, Multiple Sclerosis International Federation. *Atlas: Multiple sclerosis resources in the world* 2008. Geneva: World Health Organization; 2008. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/43968>
- [4] Miletta M, Bogliatto F, Bacchio L. Multidisciplinary management of sexual dysfunction, perineal pain, and elimination dysfunction in a woman with multiple sclerosis. *Int J MS Care.* 2017; 19(1):25-8. [\[DOI:10.7224/1537-2073.2015-082\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [5] Tajikesmaeli A, Hakim Abadim G. [Sexual functions and marital adjustment married woman with Multiple Sclerosis (Persian)]. *Res Psychol Health.* 2016; 10(2):1-9. [\[Link\]](#)
- [6] Kooranian F, Foroughipour M, Khosravi A. [Association of disability with urinary and sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis (Persian)]. *Iran J Obstet Gynecol Infertil.* 2018; 20(11):39-46. [\[DOI:10.22038/IJOGI.2018.10226\]](#)
- [7] Ghasemi V, Simbar M, Ozgoli G, Nabavi SM, Alavi Majd H, Mohammad Souris B, et al. The prevalence of sexual dysfunction in Iranian women with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. *Shiraz E-Med J.* 2019; 20(6):e83490. [\[DOI:10.5812/semj.83490\]](#)
- [8] Merghati-Khoei E, Qaderi K, Amini L, Korte JE. Sexual problems among women with multiple sclerosis. *J Neurol Sci.* 2013; 331(1-2):81-5. [\[DOI:10.1016/j.jns.2013.05.014\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [9] Delaney KE, Donovan J. Multiple sclerosis and sexual dysfunction: A need for further education and interdisciplinary care. *NeuroRehabilitation.* 2017; 41(2):317-29. [\[DOI:10.3233/NRE-172200\]](#) [\[PMID\]](#)
- [10] Asadpour E, Veisi S. [The effectiveness of emotionally focused couple therapy on sexual self-esteem and sexual function in women with multiple sclerosis (Persian)]. *J Arak Uni Med Sci.* 2017; 20(7):1-12. <http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-5174-en.html>
- [11] Aliakbari Dehkordi M. [Relationship between women sexual function and marital adjustment (Persian)]. *Int J Behav Sci.* 2010; 4(3):199-206. [\[Link\]](#)
- [12] Abedi P, Jorfi M, Afshari P. [Evaluation of the health promotion lifestyle and its related factors in reproductive aged women in Ahvaz, Iran (Persian)]. *J Community Health.* 2015; 9(1):68-74. [\[Link\]](#)
- [13] Abbasi M, Nabavi SM, Fereshtehnejad SM, Jou NZ, Ansari I, Shayegannejad V, et al. Multiple sclerosis and environmental risk factors: A case-control study in Iran. *Neurol Sci.* 2017; 38(11):1941-51. [\[DOI:10.1007/s10072-017-3080-9\]](#) [\[PMID\]](#)
- [14] Liu XJ, Ye HX, Li WP, Dai R, Chen D, Jin M. Relationship between psychosocial factors and onset of multiple sclerosis. *Eur Neurol.* 2009; 62(3):130-6. [\[DOI:10.1159/000226428\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [15] Khodaveisi M, Ashtarani F, Beikmoradi A, Mohammadi N, Mahjub H, Mazdeh M, et al. The effect of continuous care on the lifestyle of patients with multiple sclerosis: A randomized clinical trial. *Iran J Nurs Midwifery Res.* 2017; 22(3):225-31. [\[PMID\]](#)
- [16] Tell A, Tavasoli E, Sharifrad G. [Evaluation of health promoting lifestyle and its relationship with quality of life in undergraduate students of Isfahan University of Medical Sciences (Persian)]. *J Health Syst Res.* 2010; 7(4):442-8. [\[Link\]](#)
- [17] Pourghafari SS, Pasha GH, Attari Y. [A study of investigation of the effectiveness of life style components training according to individual psychology on marital satisfaction among married woman nurses of Dr. Ganjavian hospital in dezful (Persian)]. *J Soc Psychol.* 2009; 4(12):27-48. [\[Link\]](#)
- [18] Karami J, Shalani B, Hoveyzi N. [Relationship between sexual self-esteem and sexual dysfunction with marital satisfaction in nurses hopitals Kermanshah City (Iran)(Persian)]. *Qom Univ Med Sci J.* 2017; 11(9):86-93. [\[Link\]](#)
- [19] Pourmeidani S, Noori A, Shafti SA. [Relationship between life style and marital satisfaction (Persian)]. *J Fam Res.* 2014; 10(3):331-4. [\[Link\]](#)
- [20] Mahmoodi Z. *Life Style, Concepts and Approaches*. Tehran: University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare Press; 2014. [\[Link\]](#)
- [21] Alpar SE, Şenturan L, Karabacak Ü, Sabuncu N. Change in the health promoting lifestyle behaviour of Turkish University nursing students from beginning to end of nurse training. *Nurse Educ Pract.* 2008; 8(6):382-8. [\[DOI:10.1016/j.nep.2008.03.010\]](#) [\[PMID\]](#)
- [22] Abedi P, Jorfi M, Afshari P, Fakhri A. How does health-promoting lifestyle relate to sexual function among women of reproductive age in Iran? *Glob Health Promot.* 2018; 25(3):15-21. [\[DOI:10.1177/1757975917706831\]](#) [\[PMID\]](#)
- [23] Karimloo V, Charandabi SM, Malakouti J, Mirghafourvand M. Effect of counselling on health-promoting lifestyle and the quality of life in Iranian middle-aged women: A randomized controlled clinical trial. *BMC Health Serv Res.* 2019; 19(1):350. [\[DOI:10.1186/s12913-019-4176-0\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [24] Wood FG, Alley E, Baer S, Johnson R. Interactive multimedia tailored to improve diabetes self-management. *Nurs Clin North Am.* 2015; 50(3):565-76. [\[DOI:10.1016/j.cnur.2015.05.009\]](#) [\[PMID\]](#)
- [25] Mohaddes Ardebili F, Mehdmandar M, Bozorgnejad M, Khalili E, Hosseini AF, Mobaderi T. [The effectiveness of multimedia self-care education on burn patients' quality of life: An application of latent growth model (Persian)]. *Razi J Med Sci.* 2019; 25(12):33-42. [\[Link\]](#)
- [26] Khakpoor S, Niknami S, Tavafian SS, Goodarzi A. [Traditional and modern teaching methods in improving eating behaviors of female elementary school students in Chabahar, Iran (Persian)]. *J Mil Caring Sci.* 2016; 3(1):41-7. [\[DOI:10.18869/acad-pub.mcs.3.1.41\]](#)

- [27] Emadi SR, Vakilifard AR, Kavosui AR. [The effect of constructivist multimedia software on the learning of basic Farsi words (Persian)]. *J Teach Persian Speaker Lang.* 2015; 4(10):47-64. [\[Link\]](#)
- [28] Mazinani R, Akbari Mehr M, Kaskian A, Kashanian M. [Evaluation of prevalence of sexual dysfunctions and its related factors in women (Persian)]. *Razi J Med Sci.* 2013; 19(105):59-66. [\[Link\]](#)
- [29] Dehghan-Nayeri N, Khakbazan Z, Ghafoori F, Nabavi SM. Sexual dysfunction levels in Iranian women suffering from multiple sclerosis. *Mult Scler Relat Disord.* 2017; 12:49-53. [\[DOI:10.1016/j.msard.2017.01.005\]](#) [\[PMID\]](#)
- [30] Tavakol Z, Mirmolaei ST, Movahed Z. [The survey of sexual function relationship with sexual satisfaction in referred to Tehran South City health centers (Persian)]. *Avicenna J Nurs Midwifery Care.* 2011, 19(2):50-4. [\[Link\]](#)
- [31] Sealed Envelope. Simple randomisation service', Randomisation and online databases for clinical trials [Internet]. 2020 [Updated 2020 May]. Available from: [\[Link\]](#)
- [32] Sanders AS, Foley FW, LaRocca NG, Zemon V. The multiple sclerosis intimacy and sexuality questionnaire-19 (MSISQ-19). *Sexu Disabil.* 2000; 18(1):3-26. [\[DOI:10.1023/A:1005421627154\]](#)
- [33] Mohammadi K, Rahnama P, Mohammaditabar S, Montazeri A. [Validation of the Persian version of multiple sclerosis intimacy and sexuality questionnaire-19 (MSISQ-19) (Persian)]. *Payesh.* 2014; 13(5):602-7. [\[Link\]](#)
- [34] Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Routledge; 2013. [\[DOI:10.4324/9780203771587\]](#)
- [35] Daneshfar F, Behboodi-Moghadam Z, Khakbazan Z, Nabavi SM, Nayeri N, Ghasemzadeh S, et al. The influence of Ex-PLIS-SIT (extended permission, limited information, specific suggestions, intensive therapy) model on intimacy and sexuality of married women with multiple sclerosis. *Sex Disabil.* 2017; 35(4):399-414. [\[DOI:10.1007/s11195-017-9482-z\]](#)
- [36] Dasgupta R, Wiseman OJ, Kanabar G, Fowler CJ, Mikol D. Efficacy of sildenafil in the treatment of female sexual dysfunction due to multiple sclerosis. *J Urol.* 2004, 171(3):1189-93. [\[DOI:10.1097/01.ju.0000113145.43174.24\]](#) [\[PMID\]](#)
- [37] Lúcio AC, D'Ancona CA, Lopes MH, Perissinotto MC, Damasceno BP. The effect of pelvic floor muscle training alone or in combination with electrostimulation in the treatment of sexual dysfunction in women with multiple sclerosis. *Mult Scler.* 2014; 20(13):1761-8. [\[DOI:10.1177/1352458514531520\]](#) [\[PMID\]](#)
- [38] Mosalanejad F, Afrasiabifar A, Zoladl M. Investigating the combined effect of pelvic floor muscle exercise and mindfulness on sexual function in women with multiple sclerosis: A randomized controlled trial. *Clin Rehabil.* 2018; 32(10):1340-7. [\[DOI:10.1177/0269215518777877\]](#) [\[PMID\]](#)
- [39] Ahani L, Chorami M, Sharifi T, Ghazanfari A, Adibi Sedeh I. The effect of mindfulness psych-educational group intervention on improving sexual function of women with multiple sclerosis. *Prev Care Nurs Midwifery J.* 2021; 11(4):35-45. [\[DOI:10.52547/pcnm.11.4.35\]](#)
- [40] Giannantoni A, Proietti S, Giusti G, Gubbiotti M, Millefiorini E, Costantini E, et al. OnabotulinumtoxinA intradetrusorial injections improve sexual function in female patients affected by multiple sclerosis: Preliminary results. *World J Urol.* 2015, 33(12):2095-101. [\[DOI:10.1007/s00345-015-1578-4\]](#) [\[PMID\]](#)
- [41] Ghasemi V, Nabavi SM, Simbar M, Ozgoli G, Majd HA, Mirshafaei MS, et al. The effect of sexual health promotion package on sexual life in women with multiple sclerosis: Designed based on the results of a mixed method study. *Sex Disabil.* 2021; 40:57-75. [\[DOI:10.1007/s11195-021-09697-w\]](#)
- [42] Mahan LK, Raymond JL. Krause's Food & The Nutrition Care Process, Iranian Edition E-Book. London: Elsevier Health Sciences UK; 2016. [\[Link\]](#)
- [43] Pazokian M, Shaban M, Zakerimoghdam M, Mehran A, Sangelagi B. [A comparison between the effect of stretching with aerobic and aerobic exercises on fatigue level in multiple sclerosis patients (Persian)]. *Qom Univ Med Sci J.* 2013; 7(1):50-6. [\[Link\]](#)
- [44] Looker T, Gregson O. Managing Stress [M Rezaei, M Zhekan, Persian trans]. Mashhad: Atabak; 2009. [\[Link\]](#)
- [45] Bolton R. People skills. Simon and Schuster [HR Sohrabi, A Hayat Roshanaei, Persian trans]. Tehran: Roshd; 2002. [\[Link\]](#)
- [46] Badaleh A, Alinasab E, Rezazadeh HR. [The effectiveness of police multimedia training packages on students' attitudes towards social security (Persian)]. *J Soc Ord.* 2020; 12(1):77-98. [\[Link\]](#)

This Page Intentionally Left Blank