

ترجمه: افتخارالسادات حاج کاظمی

ویرایش: ملک تاج مشکبید

حامملگی

به این نکات توجه کنید

حامملگی خود را پنهان نکنید و با همکاران خود نیز آن را در میان بگذارید. بخاطر داشته باشید که جنین در سه ماهه اول بسیار آسیب‌پذیر می‌باشد. زودتر از آنچه که متوجه شوید جنین آسیب خواهد دید. اگر همکاران شما از حاملگی شما باخبر باشند، می‌توانند مراقب

این کار سبب می‌شود که او نسبت به هر خطر بالقوه‌ای در مورد شما هوشیار باشد. سپس شما با پرستار بهداشت و مسئولین محل کار خود ملاقات کرده و آنها را در جریان قرار دهید، شاید مدیره پرستاری شما تصمیم بگیرد در مورد مسئولیتهای روزانه شما تغییراتی به وجود آورد.

اگر همه زنان حامله در دوران حاملگی نگران جنین خود هستند، نگرانی زنان حامله پرستار واقعی تروجده تر می‌باشد. کدام گروه از زنان شانس بیشتری برای ابتلا به مول هیدراتی^۱ فورم، آمبولی مایع آمینوتوتیک^۲ یا سندروم شیهان^۳ را خواهند داشت؟

خوبشخانه این مشکلات پیچیده نادر هستند، اما نظرات ناشی از آنچه که شما بطور روزانه با آن در تماس هستید مثل بیماریهای عفونی، مواد رادیواکتیو، داروهای ضد سرطان و دیگر مواد شیمیائی چه؟ همچنین زمانیکه شما بیمار را در تخت جابجا می‌کنید یا تختی را درست می‌کنید امکان صدمه و خطر برای شما وجود دارد.

هر کدام از این موارد می‌تواند به سلامتی شما یا جنین شما صدمه بزند. امکاناتی وجود دارد که اگر در زمان اشتغال به کار به آنها توجه کنید، خود و جنین خود را از هرگونه آسیب محافظت خواهید کرد.

لطفاً حاملگی خود را مخفى نگه ندارید:

به محض اینکه از حاملگی خود مطلع شدید بلا فاصله با یک متخصص زنان در مورد حاملگی و جزئیات شغل خود مشورت کنید.





شما بوده تا چیزی سلامتی شما را تهدید نکند.

خود را از عفونت محافظت کنید:

بیماران مبتلا به بیماری عفونی جنین شما را تهدید میکنند. تاکنون شما چند بار با بیماری که دارای بیماری عفونی بوده است در تماس بوده‌اید؟ شما نباید منتظر چنین وضعی باشید، بلکه آماده باشید. اگر برای حامله شدن برنامه‌ریزی میکنید باید تیتر آنتی گر سرخجه را در خون خود اندازه‌گیری کنید چنانچه این تیتر پائین بود باید واکسن بزنید. بخاطر داشته باشید که حداقل سه ماه از واکسیناسیون بگذرد سپس حامله شوید، زیرا خود واکسن برای جنین خطرآفرین است.

همچنین قبل از حاملگی به نکات زیر توجه کنید: واکسن هپاتیت B تزریق کنید زیرا این بیماری شانس بروز سقط‌های خودبخودی زایمان زودرس و تولد نوزاد مرده را افزایش می‌دهد. ویروس هپاتیت B می‌تواند به رحم منتقل شود و یا نوزاد را به یک هپاتیت فعل مبتلا کند. این مهم نیست که شما چقدر گرفتار و مشغول هستید، بهتر است قبل از اینکه از بیماری مراقبت بعمل آورید ابتدا پرونده او را مطالعه کنید. دستورات دارویی، تاریخچه، نتیجه معاینات فیزیکی، میزان پیشرفت نتایج آزمایشگاهی و نتیجه عکسبرداری او را بخوانید و گرنه ممکن است در شرایط ناخوشایندی قرار بگیرد.

ممکن است لازم باشد از عینک دودی برای محافظت چشم استفاده کنید، یا حداقل یک عینک معمولی به چشم خود بزنید، در برابر ترشحات خود را محافظت کنید. اگر احتمال دارد که لباسهای شما به ترشحات آلوده شود گان بپوشید و در موقع ساکشن کردن ماسک بزنید. دقت کنید سوندها شما را آلوده نکنند. و هرگز سوزنهای استفاده شده را بدون سرپوش داخل ظرف آشغال نندازید.

رادیوتراپی، درمانهای دیگر:

خطر ناشی از اشعه می‌تواند منجر به سقط ناخواسته و ناهنجاریهای مادرزادی شود هرگز در زمان حاملگی، به بیمارانی که مشغول انجام دادن رادیوگرافی هستند کمک نکنید، در واقع شما بایستی در زمانیکه بخش رادیولوژی فعل است محل را ترک نکنید و اجازه ندهید کسی بخاطر صحبت موجب توقف شما در آنجا شود. پرستاری می‌گفت: در طی حاملگی ام در حالیکه تکنسین عکس پرتاپل بر میداشت از من خواست که به او کمک کنم، وقتی که مرا دو دل و مرد دید گفت که میزان اشعه در حد بی خطر می‌باشد.

در جاییکه امکان جذب اشعه برای شما وجود دارد توقف نکنید، هرگز داخل اطاق بیماری که سوزنهای رادیوم در بدن او کاشته شده و یا تحت درمان با رادیواکتیو می‌باشد وارد نشوید. هوشیار باشید

یک پرستار حامله می‌گفت: «وقتی پرستار نوبت قبلی کار روزانه‌اش تمام شد و گزارش بیمار را داد، من فهمیدم بیماری در بخش بستری است که درد ناحیه چپ شکم داشت، صدای رودهای وی به حداقل رسیده بود، میزان ادرارش نیز کم بود. ولی من نمیدانستم که او معتاد نیز هست و برای آزمایش ایدز آمده بود.

خطر فقط مربوط به هپاتیت B و سرخجه نیست بلکه تب خال، زونا، و سیستومگالو^۴ ویروس نیز می‌تواند برای جنین خطرناک باشند. وظایف بیمارستانی قابل تغییر است اگرچه کارمندان حامله نیز باید از بیماران عفونی پرستاری و مراقبت کنند. یک پرستار جراحی داخلی می‌گوید «وقتی من حامله بودم پذیرفته بودم که از انواع بیماران عفونی مراقبت کنم ولی قانون بیمارستان از اینکه پرستاران حامله فدای واحد کاری خود بشوند ممانعت کرد.

این نوع تنافضات سبب می‌شود که همکاران به شما کمک کنند. این کار یک نوع اجر گذاشتن به مادران است. «پرستاران غیرحامله‌ای هستند که داوطلب مراقبت از بیماران عفونی هستند».

چه حامله باشید، چه نباشید شما همیشه برای اطمینان بایستی نکاتی را برای محافظت خود از عفونت رعایت کنید. زمانی که مواد دفعی بیماران را بررسی می‌کنید، دستکش بپوشید، و پس از انجام کار دستکش‌ها را درآورده و دستهایتان را به دقت بشوئید.

بستگی به موقعیت شما دارد،

تا در مورد بیمارانی که اخیراً تحت درمان با داروهای هسته‌ای بوده‌اند، مثل اسکن‌های مغز، استخوان یا کبد، تماس نداشته باشید. از تماس با مواد دفعی بدن این بیماران برای مدتی بعد از تزریق اجتناب کنید. (بطور مثال ۹۶ ساعت از تماس با کسانی که با گالیوم^۵ اسکن شده‌اند، و ۲۴ ساعت از تماس با ادرار فردی که اسکن استخوان شده است اجتناب کنید).

جالب توجه است که مطالعه‌ای توسط انسوئیتو ملی برای بررسی امنیت و سلامتی شغلی پرستاران انجام شده است نتایج نشان داده‌اند که بسیاری از بیمارستانها هیچ برنامه آموزشی برای کارمندان خود در مورد محافظت از خطرات اشعه نداشته‌اند.

خدمات ناشی از داروها:

پرستارانی را که حتی برنامه‌ای برای حامله شدن دارند از کار کردن در بخش سرطان منع می‌کنند. صرفنظر از خط مشی بیمارستان، چنانچه شما در جائی کار می‌کنید که بیمارانی تحت درمان با داروهای ضد سرطان هستند آنها را به همکاران دیگر خود واگذارید. اگر لازم بود از همکاران خود خواهش کنید در زمانی که شما مشغول آماده کردن داروهای ضد سرطان هستید، شما را زیر نظر داشته باشند، یک پرستار بخش سرطان مانند سایر پرستاران دارو را می‌کشد و اضافی آن را به هوا می‌فرستد و پرستار دیگر بخارتر می‌آورد که یک بسته را که از داروخانه رسیده باز کند که در بین سیستم محافظت یک ویال شیشه‌ای ازوین کرستین^۶ (انکووین) که خوشبختانه نشکسته است پیدا می‌کند.

بسیاری از داروهای دیگر نیز می‌توانند به جنین شما صدمه بزنند، تکرار و تداوم و طولانی بودن تماس با آنها می‌تواند سبب جذب آنها گردد. بتایران زمانی که دارو آماده می‌کنید و یا دارو می‌دهید، دستکش بپوشید بویژه در مورد داروهای وریدی و داروهایی که روی آنها بحث و گفتگو است.

همچنین از مواد شیمیائی نظیر هگزا^۷ کلروفون و مواد استریل کننده و اتیلن اکسید و گازهای بیهوشی دهنده که می‌توانند دلیلی برای ناهنجاریهای مادرزادی جنین باشند و همچنین از مواد مشابهی که شما از اثرات و عوارض جانبی آن آگاه نیستید مثل تمیز کننده‌های صنعتی

سخت نگیرید:

پرستاری کاری است که مستلزم فعالیت‌های جسمی می‌باشد. شما بیمار را حرکت می‌هید تختخواب بیمار را مرتب می‌کنید کیسه‌های البسه را تخلیه می‌کنید. کیسه‌های سوند فولی را خالی می‌کنید. در هر صورت اگر حامله هستید دقت کنید به خودتان فشار وارد نیاورید زیرا استراحت کافی در طی حاملگی برای شما مهم است. همیشه از زمان مخصوص صبحانه و ناهار خود استفاده کنید و از کار در مدت زمان طولانی اجتناب کنید شما در طول نوبت کاری خود به فواصل بنشینید و چنانچه مقدور نبود که در فواصل کار استراحت داشته باشید و بموضع غذا بخورید بهتر است شغل خود را عوض کنید یا مدتی مرخصی بگیرید. با توجه به نکات واضح و مشهود، چنانچه فکر می‌کنید قادر به کار خود را بطور تمام وقت دریخش خودتان ادامه دهید تا زمانی که وظیفه دارید کار کنید. دیگر نیازی نیست که برنامه کاری خود را با سلامتی خود و جنین-وفق دهید. درست از فکرتان استفاده کنید. از خود مراقبت کنید و استراحت نمائید.

- ۱- Hydatidiform mole . ۲- Amniotic fluid Embolism . ۳- Sheehans syndrom . ۴- Cytomegalovirus . ۵- Gallium . ۶- Vincristine (oncovin) . ۷- Hexachlorophene



Nurse and pregnancy

Author: Hajkazemi E, Moshkebid M.

Abstract: Although all pregnant women are worry about their fetus, it is more serious in pregnant nurses. We are not talking about Hydatidiform mole, Amniotic fluid embolism, and Sheehans syndrome. Fortunately these disorders are rare. Instead what are serious for a pregnant nurse are infection diseases, radioactive materials, anticancer agents, and other chemicals. Meanwhile when a nurse remove patient in bed or give a good shape to a bed, it's possible to be hurt. In order to protect herself and her fetus from any damage, she should consult to an obstetrician about her job's details immediately, and be aware of securities in her job's environment.

Key words: nurse, pregnancy, job securities.