بـررسي مـيزان أكـاهي مـادران درمـورد نـيازهاي جسـمي وروانـي – اجـتماعي كـودكانشان که تحتشیمی درمانی قرار دارند وار تباط آن با چگونگی تامین این نیازها درمراجعین به مرکز پزشکی سیدالشهدا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۲).

پژوهشگر:محبوبه نم نباتی کارشناس ارشد پرستاری

استاد راهنما :خانم طاهره اكبرشريفي عضو هيأت علمي دانشكده پرستارى ومامايى دانشگاه علوم پزشكى ايران.

استاد مشاور: خانم شعهلا روشننروان عضوهيأت علمي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم یزشکی ايران.

استاد آمار:آقای دکتر محمود محمودی عضوهیأت علمی دانشكده بهداشت دانشگاه تهران

این پژوهش یک مطالعه همخوانی یا همبستگی است که درآن ارتباط بین میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای جسمی وروانی - اجتماعی کودکانشان که تحت شیمی درمانی قرار دارند با چگونگی تامین این نیازها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه ۳۲ نفر از مادرانی که جهت شیمی درمانی کودکانشان به مرکز پزشکی سیدالشهداء مراجعه نموده اند،در پژوهش شرکت داده شدند.نمونه گیری به مدت ۵۰ روز و به روش تصادفی صورت گرفته است ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بودهاست. یافته های پژوهش درقالب ۲۵ جدول تدوین شده است .نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت مادران در مورد نیازهای جسمی وروانی -اجتماعی آگاهی مناسبي نداشتند واكثريت آنها اين نيازها رابه نحو صحیحی تامین نمی کر دند. ما weinman & clai

هستند.اگر به رشد و تکامل چنین سرمایه های عظیمی توجه نشود، جامعه فردابا مخاطرات جدي وغير قابل جبرانی روبرو خواهد شد.از طرفی کودکان بخش اعظم

بیان مسئله پژوهش

افراد جامعه انساني را تشكيل مي دهند محموديان (۱۳۶۸) در این خصوص اعلام می دارد ،بیش از یک سوم جمعیت جهان را کودکان کمتر از ۱۵ سال تشکیل می دهند.تعداد این کودکان در جهان ۱/۳ میلیارد نفر است که ۸۳٪ آنها در کشورهای درحال توسعه زندگی

كودكان تمامي آينده هركشور وسرمايه واقعي هر ملتي

مي كنند.

با توجه به اهميّت اين قشر عظيم، نظارت دقيق برسلامت آنان اثرات ژرفی در ایجاد یک اجتماع سالم خواهد داشت بنابراین باید امکانات لازم جهت رشدوتکامل طبیعی آنان مهیا گردد.این امر درگرو تامین نیازهای آنان در مراحل مختلف سنی وشرایط ویژه است .باعتقاد ویلی و وانگ(۱) (۱۹۸۷) شرایطی نظیر سرطان ودرمان آن نیازهای کودک را افزایش می دهد.نکته حائز اهمیت درمورد سرطانهای دوران كودكى بهتر شدن پيش آگهى آن درطول سه دهه گذشته می باشد.افزایش میزان بهبودی درگرو پیشرفتهای حاصله در درمان این بیماری است.

شیمی درمانی (۲) یکی از متداولترین درمانهائی است که نقش مهمی در درمان سرطان به عهده دارد.چنانکه در دهه ۱۹۸۰ سالیانه ۱۰۰۰۰ بیمار مبتلا

-1 Whaly & Wong -2 Chemotherapy

فرضیه های پژوهش

۱ - میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای جسمی کودکانشان که تحت شیمی درمانی قرار دارند با چگونگی تامین این نیازها ارتباط دارد.

۲ - میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای روانی - اجتماعی کودکانشان که تحت شیمی درمانی قرار دارند با چگونگی تامین این نیازها ارتباط دارد.

روش پژوهش مسلم معاصدة والشادية والمصاد

نوع پژوهش: شالنس کشی یک مریه دوایه به ندیاه

این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که در آن ارتباط بین میزان آگاهی مادران از نیازهای جسمی وروانی - اجتماعی کودکانشان با چگونگی تامین این نیازها مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه پژوهش: 🏗 🛒 🖟 او در پروجا یا در داشتاریاد

دراین تحقیق ،شامل کلیه مادران واجد شرایط پژوهش است که به مرکز پزشکی سیدالشهداء مراجعه نموده اند.

نمونه پژوهش: ﴿ عَالَمُ النَّا النَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

در این پژوهش نمونه گیری بصورت تصادفی انجام گرفته است، بدین ترتیب که پژوهشگر به مدت ۵۰روز به مرکز پزشکی سیدالشهداء مراجعه نموده است ومادرانی که در طی این مدت جهت شیمی درمانی کودکشان به این مرکز مراجعه نموده اند را فقط یکبار در امر تحقیق شرکت داده است دراین بررسی تعداد ۳۲ نفر از مادران واجد شرایط انتخاب گردیدند.

مشخصات واحدهای مورد پژوهش: علالتها مست- ۱

کلیه واحدهای مورد پژوهش مشخصات زیر را دارا بوده اند:

۱ - کلیه واحدهای مورد پژوهش دارای حداقل یک فرزند ۱۲-۶ سال بوده اند که جهت ادامه شیمی

درمانی به مرکز پزشکی سیدالشهداء مراجعه نمودهاند. ۲ - فرزندان کلیه واحدهای پژوهش از طریق وریدی یا از طریق ستون فقرات شیمی درمانی می شده اند.

۳ - کلیه واحدهای مورد پژوهش قادر به پاسخگویی سؤالهای پرسشنامه بودند.

۴ - واحدهای مورد پژوهش وکودک مبتلا به سرطان معلولیت جسمی وروانی شناخته شده دیگری نداشتند.

محيط پڙوهش: ﴿ وَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

محیط این پژوهش مرکز پزشکی سیدالشهداء وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.

ابزار گردآوری دادهها می دایا است کاری بالسجی

بمنظور دستیابی به اهداف این پژوهش، پرسشنامهای در سه بخش تهیه گردید.بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونهها از جمله سن، مسیزان تصحصیلات، شغل همسر،تحصیلات مشکلات در دوره شیمی درمانی بود.در بخش دوم سوالات مربوط به چگونگی تامین نیازهای جسمی و روانی + اجتماعی مطرح گردید و در بخش سوم سوالات مربوط به میزان آگاهی در مورد نیازهای جسمی و جسمی و روانی - اجتماعی مطرح گردید و در بخش سوم سوالات مربوط به میزان آگاهی در مورد نیازهای

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در ایس پیژوهش از روشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است بیمنظور دستیابی به اهداف پژوهش از جداول توزیع فراوانی مطلق ونسبی استفاده شد وبیشترین در ضدها مشخص گردید. همچنین آزمونهای آماری کای دو، آزمون دقیق فیشر و آزمون کوکران بکار برده شد.معیار سنجش برای تعیین میزان آگاهی و چگونگی تامین نیازها ،میانگین پاسخهای صحیح بود یعنی افرادی که مجموع

درمانی قرار دارد ،آگاه نمایند و آموزشهای لازم را به آنها بدهند، زیرا به اعتقاد برنز (۱) (۱۹۸۲) والدین جهت تامین نیازهای جسمی و روانی -اجتماعی کودک نیاز به آموزش وسیعی دارندوپرستار می تواند بعنوان معلم و راهنما به آنها کمک نماید.

همچنین یافته ها نشان می دهد که بین میزان آگاهی از نیازهای روانی - اجتماعی با چگونگی تامین این نیازها ارتباط معنی داری وجود دارد بدین معنی که اکثریت نمونه ها بدلیل عدم آگاهی ،نیازهای روانی - اجتماعی را بنحو صحیحی تامین نکرده بودند.با توجه به اینکه مسائل روانی دوران کودکی ،در سلامت روانی آینده كودك نقش مهمي دارد ،توجه به بهداشت رواني وآموزش آن به والدين مورد تاكيد است چراكه در فرهنگ ما، بسیاری از والدین در مورد نحوه صحیح تامین نیازهای روانی -اجتماعی به هنگام بیماری آگاهی ندارند.معمولا" بسیاری از والدین یا کودک بیمارشان را تحت حمايت بسيار قرار داده و /يا بعلت خستگي از بیماری کودکشان ،او را طرد می نمایند.لذا لازم است علاوه بر پرستاران ،وسایل ارتباط جمعی نیز در مورد نیازهای روانی - اجتماعی کودکان به هنگام بیماری آگاهیهای لازم را در اختیار عموم قرار دهند.

یافته های دیگر این پژوهش نشان می دهد که بعضی از عوارض شیمی درمانی نظیر تهوع واستفراغ، عصبی شدن ،خستگی زودرس در فرزندان اکثریت واحدهای مورد پژوهش بروز نموده که خود باعث افزایش نیازهای جسمی وروانی – اجتماعی در فرد می گردد.بنابراین لازم است پرستاران در طی آموزش به والدین در رابطه با این عوارض ونیازهائی که در پی دارد ومراقبتهای آن ،والدین را آگاه نمایند وبه آنها اطمینان دهند که بعد از دوره شیمی درمانی بسیاری از این عوارض برطرف خواهد شد تا والدین وکودک از نظر روحی و روانی مورد حمایت قرار گرند.

از دیگر دستاوردهای این پژوهش آن است که بین تحصیلات مادران ومیزان آگاهی آنها از نیازهای روانی -اجتماعی کودک تحت شیمی درمانی ارتباط وجود دارد.بدین معنی که اکثر مادران با آگاهی مناسب که نیاز

کودکانشان را تامین کرده بودند در مقطع تحصیلی راه استمائی ، مستوسطه ، دیپلم و بالاتر از آن قرار داشتند بنابراین سواد مادر نقش ارزنده ای در سلامت کودکان ایفا می کند لذا می توان با همکاری و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش ، والدین و بویژه مادرانی را که دارای کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن هستند به امر سواد آموزی ترغیب نمود تا نیازهای کودکان را بهتر تامین نمایند.

پیشنهادهائی برای پژوهشهای بعدی:

- بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای جسمی وروانی - اجتماعی کودکان زیر ۶ سال که تحت شیمی درمانی قرار دارند وارتباط آن با چگونگی تأمین این نیازها.

- بررسی تأثیر آموزش به مادران در مورد نحوه مراقبت از کودکان تحت شیمی درمانی .

- بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای جسمی وروانی - اجتماعی کودکانشان که تحت پرتو درمانی قرار دارند وارتباط آن با چگونگی تأمین این نیازها.

پسش داری سپوشی سے حیوان اضطا اب سرونده

- 1 Galbraith. Lisak and etal. "Treatment for alteration in oral mucosa related to chemotherapy". Pediatric Nursing. Vol. 17. No.3. 1997.pp:233-236.
- 2 Meeropol , Ellen. "parental needs Assessment".A disign for clinical Nurse Specialist Practice".

Pediatric Nursing . Vol.17. No. 5. 1997. pp: 456-459.

- 3 Nieweg, Roos. and etal. "Nursing Care for oral complication association With chemotherapy". oncology Nursing. Vol. 1. No.5. 1992. pp: 771-776.
- 4 Parker, G Wendolyr. "Chemotherapy Administration in the home". Home Heatth care Nurse. Vol. 9. No. 1. 1992. pp: 30-36.

Correlation between the level of mothers' knowledge of physical and psychosocial needs of their chemotherapied children

(by: Mahboobeh Nam Nabaty)

This study surveys the correlation between the level of mothers' knowledge of physical and psycho-social needs of their chemotherapied children and the way they meet their needs.

In this study 32 mothers visiting Sayed-O-Shohada hospital in Esfahan were randomly selected samples over a period of 50 days. The data collection tool was a questionnaire organized in three parts. Part one was about demographic personal details of the samples. Part two dealt with the way the mothers met their children's physical and psycho-social needs and in part three the level of mothers knowledge of their children's physical and psycho-social needs was evaluated.

The findings of this study are shown in 25 tables in which descriptive and analytical and two statistical methods are used. The findings pertinent to the first hypothesis of research (i.e., the level of mothers' knowledge of the physical needs of their chemotherapied children is correlated to the

way they meet these needs) revealed that the majority of mothers (56.2%) had no appreciable 1ge knowledge of their children's physical needs and a majority of them (68.8%) did not treat these needs properly. Although 42.8% of samples had sufficient understanding, only 31.2% of them met the physical needs correctly. No meaningful relationship was found in the statistical test between in the level of

knowledge of the physical needs and the way they are met (x2 = 0.33 df = 1). Thus the 10 research hypothesis is refused with 95% assurance: and therefore it is incorrect to say that mothers with higher knowledge meet their children's physical needs because some mothers are aware of their children's needs but they do not treat them properly.