

ایمن سازی هپاتیت B

افتخارالسادات حاجی کاظمی*

این افراد از نظر بالینی هیچ علامتی ندارند و به صورت اتفاقی پس از اهداء خون از بیماری خود مطلع می‌شوند. آزمایش‌های کبدی آنها طبیعی است و احتیاج به بیوپسی کبد ندارند. اگر هم بیوپسی انجام گیرد "معمولًا" در حد طبیعی است. این گروه تا آخر عمر (هرشش ماه یکبار) باید از نظر آزمایش‌های کبدی، آلفافیتوپروتئین سرم و سونوگرافی از کبد پی‌گیری شوند (ملک زاده و همکاران ۱۳۷۶). اما از آنجا که این افراد دارای ویروس بیماری درخون خود می‌باشند می‌توانند بیماری را به افراد دیگر انتقال دهند. به همین دلیل سازمان انتقال خون بطور معمول کلیه خونهای اهدایی را از نظر ویروس هپاتیت B و C مورد بررسی قرار داده و اهداء کنندگانی را که خون آنها آلودگی داشته باشد شناسایی و مورد پی‌گیری قرار می‌دهد و از مصرف خون آنها جلوگیری به عمل می‌آورد. به این ترتیب است که شیوع هپاتیت B در اثر تزریق خون و فرآورده‌های خونی، از ۸-۱۰ درصد به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است (نشریه شماره ۱ مرکز تحقیقات، ۱۳۷۹).

باتوجه به آمار وارقامی که از جهان وایران ذکر گردید پیداست که پیشگیری از ابتلاء به بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد. از همین رو سازمان بهداشت جهانی تاکید بر گنجانیدن واکسن هپاتیت B در "برنامه گسترش ایمن سازی" (EPI) کشورها دارد. بسیاری از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی به این توصیه عمل نموده و این واکسن را به برنامه واکسیناسیون معمول خود در دوران کودکی و برای کلیه نوزادان اضافه نموده‌اند. چرا که این واکسن بهترین نتیجه و بالاترین حد ایمنی را در نوزادان و شیرخواران ایجاد می‌کند. با بالا رفتن سن، بخصوص در افراد مسن، میزان ایمنی

ویروس هپاتیت B یکی از جدی‌ترین انواع هپاتیت را سبب می‌شود. این بیماری شایعتر و ۱۰۰ برابر مسری‌تر از ایدز است (نشریه شماره ۱ مرکز تحقیقات، ۱۳۷۹). در کشور ایران، شایعترین علت هپاتیت حاد و مزمن و هم‌چنین سیروز کبدی و هپاتوسولار کارسینومای کبدی در بالغین، هپاتیت B می‌باشد (نشریه شماره ۲ مرکز تحقیقات، ۱۳۷۹). ابتلاء به این ویروس در بیش از دو میلیارد نفر از مردم جهان اتفاق افتاده است و هم‌اکنون در سطح جهانی بیش از ۳۵۰۰۰۰۰۰ نفر حامل این ویروس هستند. حاملین ویروس منبع اصلی انتشار آن در جوامع بوده و هر ساله حداقل یک میلیون نفر در اثر ابتلاء به این ویروس و عوارض آن در سطح جهان تلف می‌شوند. (نشریه شماره ۱، مرکز تحقیقات، ۱۳۷۹). براساس پژوهش‌های به عمل آمده در تهران ۳/۶ درصد مردان و ۱/۶ درصد زنان حامل sAg HB می‌باشند و نیز ۳۷ درصد از دهنده‌گان خون داوطلب، آنتی‌بادی sHB را در خون خود دارند. این آمار نشان دهنده این واقعیت است که حدود ۴۰ درصد از افراد جامعه ایران با این ویروس تماس داشته ولی فقط ۳ درصد آنها حامل آنتی‌زن باقی مانده‌اند. بنابراین می‌توان در نظر گرفت که چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر از جمیعت کشور در تماس با این ویروس بوده‌اند که حدود ۲-۱/۸ میلیون نفر آنها به صورت حامل باقی مانده‌اند. حدود یکصد هزار نفر به علت این ویروس در هر سال بیمار می‌شوند و ممکن است احتیاج به بستری شدن داشته باشند. ۶-۸ هزار نفر نیز به علت بیماری و عوارض هپاتیت B هرساله فوت می‌کنند (نشریه شماره ۲ مرکز تحقیقات، ۱۳۷۹).

حامelin سالم و جامعه

- مشکل بودن دستیابی به گروههای پرخطر
- عدم اجرای استراتژی صحیح و علمی در سطح ملی برای پیشگیری

نکات مهم در مورد واکسیناسیون هپاتیت B

براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف ۱۵-۵ درصد افراد پس از یک دوره واکسیناسیون کامل، آنتی بادی کافی بر علیه ویروس HBV پیدا نمی کنند. علل عدم پاسخ ایمنی را سن بالاتر از ۵۰ سال، چاقی زیاد، مصرف وافر روزانه سیگار و عفونت با HIV ذکر می کنند. علاوه بر موارد ذکر شده نکاتی مانند رعایت نکردن اصول صحیح واکسیناسیون نظیر یخ زدن واکسن، تزریق در محل نامناسب، روش نامناسب تزریق و عدم رعایت فواصل واکسن را در عدم پاسخ ایمنی موثر دانسته اند.

بنابراین با قبول این نکته که واکسیناسیون موثرترین روش برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری هپاتیت B می باشد، با پرسش و پاسخهایی که در ذیل آمده سعی شده است تا جوانب مختلف واکسیناسیون هپاتیت B بررسی شود تا نکات مهم بر همگان روشن گردد.

س: اولین بار در چه سالی و در کجا واکسن هپاتیت ساخته شد و مورد تائید قرار گرفت؟

ج: در سال ۱۹۸۱ و در کشور آمریکا

س: ماهیت واکسن چیست؟

ج: آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B

س: در حال حاضر چند نوع واکسن هپاتیت B وجود دارد؟

ج: در حال حاضر واکسنها بر دو نوعی دارند

- واکسن پلاسمایی (Hepatavak B): این نوع واکسن از پلاسمای حاملین مزمن به بیماری مشتق می شود.

بخشی این واکسن کاهش می یابد (کتابخانه Catholic).
۱۹۹۹.

واکسیناسیون باعث گردیده است تامیزان شیوع HBV کاهش پیدا کند ولی با توجه به وجود بیش از ۳۵۰ میلیون حامل در سطح جهان که اکثر آنها در کشورهای آسیایی و افریقایی زندگی می کنند هنوز عفونت با این ویروس در مقیاس وسیعی وجود دارد و اقدامات جدی تر برای پیشگیری از آن لازم است.

با وجود لزوم اجرای واکسیناسیون کارکنان پزشکی، متاسفانه هنوز هم نزدیک به نیمی از قادر پزشکی و پیراپزشکی واکسن دریافت نکرده اند. این واقعیتی است در کشور ما با وجود فراهم بودن امکانات واکسیناسیون رایگان، بخش عظیمی از تیم پزشکی در این مورد اقدام نکرده اند. در استراتژی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت پیشنهاد گردیده است تا کلیه پرسنل شاغل در حرفة پزشکی و رشته های وابسته که با بیماران سروکار دارند و در محیط های بیمارستانی، درمانگاهی و خانه سالمندان کار می کنند به صورت رایگان بر علیه هپاتیت B واکسینه گردند و عدم انجام آن را شتابه دانسته و موسسات را موظف به پیگیری آن می داند (ملکزاده و همکاران ۱۳۷۶).

دلایل عدم موفقیت برنامه واکسیناسیون در هر کشور یا منطقه بسیارند. در برنامه های ملی باید با توجه به شرایط خاص کشور و منطقه برای رفع این موضع تمهدات لازم را به عمل آورده. ولی به هر حال به طور کلی می توان از عوامل زیر نام برد (ملک زاده و همکاران ۱۳۷۶):

- ضرورت تکرار سه نوبت (دوره کامل) واکسن

- عدم اطلاع پزشکان و قادر پزشکی از اندیکاسیونها اهمیت، موثر بودن و بی ضرر بودن واکسن

- وجود شایعات و اطلاعات غلط در بین مردم و حتی قادر پزشکی در مورد عوارض واکسن

س: محل مناسب تزریق واکسن کجاست؟

ج: در کودکان زیر ۱۸ ماه ۳۱ میانی خارجی عضله ران و در افراد بالای ۱۸ ماه ۳۱ فوقانی خارجی عضله دلتونئد.

س: با توجه به اهمیت رعایت زنجیره سرد (Cold chain) در امر واکسیناسیون، واکسن هپاتیت B را چگونه

نگهداری کنیم تا کارآیی آن کاملاً حفظ شود؟

ج: واکسن هپاتیت B برخلاف سایر واکسنها نسبت به گرما مقاوم است ولی به هر حال بهتر است در طبقه میانی یخچال مخصوص واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری شود. اما نباید یخ بزند.

س: آیا در پایان یک روز کاری می‌توان بقیه واکسن را به یخچال مخصوص واکسن برگرداند؟

ج: در صورتی که نکات زنجیره سرد در خارج یخچال رعایت شده باشد در پایان یک روز کاری و حتی تا پایان تاریخ انقضای واکسن باقی‌مانده قابل مصرف است.

س: مناسب‌ترین زمان انجام واکسیناسیون کودکان چه وقت است؟

ج: نوبت اول بلا فاصله بدو تولد، نوبت دوم ۱/۵ماهگی همراه با واکسن DPT و پولیو و نوبت سوم نه ماهگی همراه با واکسن سرخک.

س: اگر کودکی در بدو تولد نوبت اول واکسن هپاتیت B را دریافت نکرد چه باید کرد؟

ج: نوبت اول در اولین فرصت تا قبل از ۱۵ روزگی، نوبت دوم ۱/۵ماهگی و نوبت سوم در ۹ ماهگی مطابق با بقیه نوزادان تزریق شود. در غیر اینصورت نوبت اول در ۱/۵ماهگی، نوبت دوم در سه ماهگی و نوبت سوم در ۹ ماهگی تزریق گردد.

س: اگر کودکی تاسه ماهگی هیچیک از نوبتهاي واکسن هپاتیت B را دریافت نکرده باشد چه کار باید کرد؟

- واکسن نوترکیبی (Recombinant DNA)

نوع جدیدتری نسبت به واکسن پلاسمائی است که با استفاده از علم مهندسی ژنتیک ساخته شده است.

س: آیا واکسن پلاسمایی خطرابتلا به بیماری ایدز را به همراه دارد؟

ج: خیر، تاکنون گزارشی در این زمینه داده نشده است.

س: قیمت یک دوره، واکسن چقدر است؟

ج: حدوداً ۷۸۰۰۰ ریال، اگرچه قیمت آن نسبت به سایر واکسنها گران‌تر است و هزینه زیادی را به سیستم بهداشت جامعه تحمیل می‌کند ولی نتایجی که عاید می‌شود بسیار ارزشمندتر از هزینه ایجاد شده است.

س: هدف از قرار دادن واکسن هپاتیت B در "برنامه گسترش واکسیناسیون" (EPI) چه بود؟

ج: پیشگیری از انتقال عمودی وافقی بیماری.

س: واکسیناسیون هپاتیت B در ایران از چه زمانی ویرای چه کسانی در EPI قرار گرفت؟

ج: از فروردین ۱۳۷۲، برای نوزادان پس از تولد و گروههای در معرض خطر.

س: عوارض جانبی واکسن هپاتیت B چیست؟

ج: عوارض بعداز تزریق بسیار ناچیز و در حدی است که قابل چشم پوشی می‌باشد.

س: مقدار (دوز) واکسن هپاتیت برای سنین مختلف چقدر است؟

ج: مطابق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افراد زیر ده سال ۵/۰ میلی لیتر، افراد بالای ده سال ۱ میلی لیتر و بیماران تالاسمیو همودیالیزی ۲ میلی لیتر می‌باشد.

س: روش تزریق واکسن هپاتیت چگونه است؟

ج: عضلانی و دریماران هموفیلی زیر جلدی.

س: در حالت عادی (به غیر از نوزادان) یک دوره کامل واکسیناسیون باید در چند نوبت و باچه فواصلی انجام گیرد؟

ج: در سه نوبت به این صورت که نوبت اول در زمان مراجعه نوبت دوم یک ماه بعد، نوبت سوم شش ماه بعد صورت گیرد.

س: آیا رعایت فواصل بین نوبتها و واکسن ضروری است؟

ج: برای ایجاد ایمنی مناسب بهتر است فواصل زمانی توصیه شده رعایت گردد. چنانچه کمتر از یک سال از واکسیناسیون گذشته باشد نیازی به تکرار دوره کامل نیست و نوبت جا افتاده را می‌توان تزریق کرد. ولی اگر بیش از یک سال گذشته باشد باید دوره کامل تکرار شود.

س: اثربخشی واکسن به چه عواملی بستگی دارد؟

ج: هرچه سن پایین‌تر باشد اثربخشی واکسن بالاتر است (تیتر آنتی بادی بالاتر است) در افراد چاق، سیگاریهای قهار و افراد مبتلا به اختلالات ایمنی متفاوت است. بیماران تحت درمان با همودیالیز و گیرندگان پیوند پاسخ ایمنی کمتری دارند و باید مقدار (دوز) بیشتری دریافت کنند. (نوبت اضافی).

س: رعایت نکات بهداشتی در افرادی که واکسینه شده‌اند نیز ضرورت دارد؟

ج: بله، با وجود اینکه واکسن فرد را تا ۹۵٪ ایمن می‌کند ولی همیشه در برخورد با حامل هپاتیت B رعایت نکات بهداشتی ضروری است.

س: آیا به غیر از نوزادان و گروههای در معرض خطر افرادی که در مواجهه با بیماری بوده‌اند واکسیناسیون برای سایرین نیز ضرورت دارد؟

ج: در این صورت باید نوبت اول در سه ماهگی، نوبت دوم در چهارونیم ماهگی و نوبت سوم در نه ماهگی تزریق شود.

× نکته مهم اینست که فواصل تزریق واکسن‌ها نباید از یک ماه کمتر باشد.

س: آیا واکسن نیاز به یادآور دارد؟

ج: در حال حاضر یادآور توصیه نمی‌شود
س: آیا تغییر نوع واکسن از نوع پلاسمایی به نوع نوترکیبی در نوبتها بعدی اشکالی دارد؟

ج: خیر، تغییر نوع واکسن هیچ تاثیری در ایجاد ایمنی ندارد.

س: آیا همزمانی واکسن هپاتیت با سایر واکسن‌ها اشکالی دارد؟

ج: خیر، این واکسن را می‌توان به صورت همزمان با DPT، پولیو، سرخک و BCG تزریق کرد.

س: تزریق واکسن هپاتیت B برای چه کسانی منع مصرف دارد؟

ج: این واکسن برای هیچکس منع مصرف ندارد. حتی افراد آنتی ژن مثبت (حامیان مژمن)، نیز می‌توانند آن را تزریق کنند هرچند که برای این گروه تاثیر خاصی ندارد. دانشمندان کوشش دارند تا با استفاده از علم ژنتیک به نوعی واکسن دست پیدا کنند که بتوانند با تزریق آن به حامیان سالم دستگاه ایمنی آنان را تحریک کنند تا به مقابله با ویروس بپردازند.

س: آیا در تمام موارد، تزریق واکسن مصنونیت ایجاد می‌کند؟

ج: به شرط انجام یک دوره کامل واکسیناسیون در ۹۵٪ درصد موارد ایمنی لازم ایجاد می‌شود.

در صورت منفی بودن مانند افراد عادی یک دوره کامل واکسیناسیون ضروری است.

س: اگر فردی با حامل هپاتیت B تماس جنسی داشت چه باید بکند؟

ج: تزریق ایمونوگلوبولین HBIG ظرف ۲ هفته بعد از تماس و یک دوره کامل واکسیناسیون توصیه می شود.
س: اگر فردی با سوزن و یا اشیاء برنده آلوده به HBV تماس پیدا کرد و سابقه واکسیناسیون نداشت چه باید بکند؟

ج: تزریق ۵ میلی لیتر HBIG در ۷۲ ساعت اول آلدگی و یک دوره کامل واکسیناسیون انجام گیرد.

س: اگر فردی با سوزن یا اشیاء برنده آلوده در تماس قرار گرفت، ولی قبل از این شده بود، آیا نیاز به واکسن مجدد دارد؟

ج: اگر از واکسیناسیون وی کمتر از ۵ سال گذشته باشد نیازی به واکسیناسیون مجدد نیست در غیراینصورت تزریق یک دوز یادآور توصیه می شود. اما بهتر است در صورت امکان تیتر Ab-HBS در سرم آزمایش گردد اگر پایین تر از ۱۰ IU/L بود علاوه بر واکسن یادآور ایمونوگلوبولین نیز تزریق شود.

س: چه تیتری از HBS-Ab به معنای مصنونیت کامل است؟

کمتر از ۱۰ واحد HBS-Ab/L سرم مصنونیت ضعیف، ۱۰-۱۰۰ واحد مصنونیت متوسط و بالاتر از ۱۰۰ واحد مصنونیت خوب تلقی می شود.

س: گروههای پزشکی در معرض خطر چه آزمایشی را باید انجام دهند؟

ج: این گروه بهتر است سالی یک بار مارکرهای HBV از جمله HBV-DNA را کنترل کنند و در صورت مثبت شدن نوع کار آنها باید تعییر یابد.

ج: چنانچه واکسن در دسترس باشد بهتر است انجام شود. اما در این موارد مهمتر از واکسن رعایت نکات پیشگیری است.

س: گروههای "درعرض خطر" چه کسانی هستند؟
ج: دندانپزشکان، جراحان، متخصصین آزمایشگاه، پرستاران، ماماهای پرسنل خدماتی مراکز بهداشتی درمانی و دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته. اساساً پیشنهاد می شود کلیه کادر بهداشت و درمان در برابر بیماری ایمن شوند.

س: آیا تزریق واکسن در دوران بارداری مجاز است؟
ج: واکسیناسیون در دوران بارداری بلامانع است ولی بهتر است زنان قبل از بارداری و یا حین بارداری از نظر HbsAg بررسی شوند تا بتوان برای لزوم انجام واکسیناسیون تصمیم گرفت.

س: برای نوزادانی که از مادر HbsAg مثبت متولد می شوند چه باید کرد؟

ج: ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت B همزمان با واکسن هپاتیت B در دو عضله جداگانه در اسرع وقت و ترجیحاً در ۱۲ اول ساعت پس از تولد تزریق شود. در صورت عدم دسترسی به ایمونوگلوبولین اختصاصی تزریق واکسن به تنها یی در ساعات اولیه پس از تولد نیز می تواند ۷۵-۹۵ درصد ایمنی ایجاد کند.

س: آیا فرد حامل هپاتیت B می تواند ازدواج کند؟

ج: بلی، ولی همسر آینده او باید قبل از ازدواج یک دوره کامل (سه نوبت) واکسیناسیون را انجام دهد.

س: برای اعضاء خانواده یک فرد مبتلا به هپاتیت B چه باید کرد؟

ج: در صورت مثبت بودن تستهای تشخیصی (HBs Ab و HBc-Ab) دیگر نیازی به واکسیناسیون نیست.

س: چه عواملی بر تصمیم‌گیری دست اندر کاران به غربالگری قبل از انجام واکسیناسیون تاثیر دارد؟

ج: شیوع عفونت دریک جامعه، شیوع مصنونیت دریک جامعه، هزینه غربالگری و هزینه واکسیناسیون.

س: چه عواملی موفقیت برنامه ایمن سازی در جوامع را تضمین می‌کند؟

ج: اطلاع از وضعیت و شرایط محلی، آموزش کارکنان برای انجام صحیح واکسیناسیون و آموزش به مردم در جهت کامل نمودن دوره.

منابع

- برنامه و راهنمای ایمن سازی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۷.

- کیم فرزلی و همکاران (۱۳۷۱)، بهداشت جهان، هپاتیت B، ترجمه محمد فراروی ۴۵ ش اول.

- مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد (۱۳۷۹)، نشریه شماره ۱ دانشگاه تهران، بیماری هپاتیت B.

- مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد (۱۳۷۹)، نشریه شماره ۲ هپاتیت B ویژه کادر پزشکی و بهداشتی.

- ملک زاده، رضا و همکاران (۱۳۷۶)، هپاتیت B ویروسی در جهان، مجله علمی نظام پزشکی.

- Catholic Health care west Library., (1999), General Health Encyclopedia, Hepatitis vaccine.

Hepatitis B vaccination

Author: Hajikazemi E.

Abstract: One of the most serious kinds of hepatitis is hepatitis B. This condition is more common than AIDS, and is 100 time more contagious. In Iran the most common cause of acute and chronic hepatitis, liver cirrhosis, and also hepatocellar carcinoma in adults, is hepatitis B. more than two billion people are infected and more than 350 million of individuals are carriers of this virus in the entire world. The carriers are main source for distributing virus in communities and annually at least, one million people in the entire world die because of this virus and its complications. According to studies in Tehran, 3.6 percent of men, and 1.6 percent of women, are carriers of Ag HBs, and also 37 percent of volunteers for blood donors have antibody of HBs Ab in their blood. This situation shows that almost 40 percent of Iranians have been contacted to this virus, but of them, 3 percent remained the carriers of antigen.

Key words: hepatitis B, vaccination, Ag HBs, HBs Ab