

## بررسی مشکلات سلامتی مادران طی ۴۵ روز بعد از زایمان

\*مریم روحی<sup>۱</sup> سکینه محمد علیزاده<sup>۲</sup>

### چکیده

اگرچه متخصصان معتقدند طی ۶ هفته بعد از زایمان تغییرات ایجاد شده در طی حاملگی به حالت اول بر می‌گردد، ولی بسیاری از مشکلات سلامتی مادران همچنان باقی مانده و تأثیر زیادی بر عملکرد روزانه مادر (مراقبت از کودک و ...) می‌گذارد. اغلب این مشکلات از سوی مادر اظهار نشده و کارکنان بهداشتی نیز به این مشکلات توجه نمی‌کنند و به همین علت مشکلات بعد از زایمان مادران مشکلات مخفی شده نامیده می‌شوند.

این مطالعه به بررسی وجود مشکلات سلامتی مادر و ارتباط این مشکلات با نوع و تعداد زایمان (در طی ۶ هفته بعد از زایمان) پرداخته است. تعداد ۱۳۳۰ مادر که برای واکسیناسیون ۴۵ روزگی کودک خود به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز مراجعه کرده بودند، تحت مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS/WIN10 با استفاده از آمار توصیفی (مطلق و درصدی و میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون مجذور کای و پیرسون) صورت گرفت.

۸۹ درصد از مادران در طی ۶ هفته بعد از زایمان حداقل یک مشکل را تجربه کرده بودند بیشترین مشکل گزارش شده توسط مادران به ترتیب کمردرد (۵۲/۷ درصد) و کمترین مشکل بی اختیاری ادراری (۲/۱ درصد) بود. ترشحات غیرطبیعی واژینال و عفونت محل بخیه‌ها و بی اختیاری ادراری، در مادران با زایمان واژینال بیشتر و بیوست و مشکلات پستان در زنان با زایمان غیر واژینال بیشتر بود. از نظر تعداد زایمان کمردرد و خستگی مادران چندزا شایع تر بود.

با توجه به فراوانی مشکلات سلامتی مادران تازه زایمان کرده و عدم توجه کافی جهت رفع این مشکلات جای آن دارد که اسباب به تغییر سیستم فعلی مراقبتی بعد از زایمان و توجه بیشتر به مشکلات مادران در طی ۶ هفته بعد از زایمان اقدامات اساسی انجام گیرد.

### واژه‌های کلیدی: مشکلات سلامتی مادران، بعد از زایمان، دوران بارداری

تاریخ دریافت: ۱۴/۶/۲۷، تاریخ پذیرش: ۱۳/۱۲/۸

<sup>۱</sup> مریم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مهاباد (\*مؤلف مسئول)

<sup>۲</sup> مریم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

**مقدمه**

درمان خونریزی، عفونت و اکلامپسی تاکید می‌گردد (Cleland و Bathtia, ۱۹۹۳). با توجه به این که تحقیقات انجام گرفته در زمینه مشکلات مربوط به سلامتی مادران بعد از زایمان در کل دنیا محدود و ناکافی بوده، به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی نیز پژوهش در این زمینه را جزء اولویت‌های تحقیقاتی اعلام نموده است (Leah, ۲۰۰۰) و در ایران نیز تحقیقات همه گیرشناصی در زمینه جوانب مختلف مشکلات سلامتی بعد از زایمان انجام نشده است بنابراین پژوهشگر به عنوان ماما بر آن گردید تا با انجام پژوهشی در این زمینه، با شناسایی وضعیت موجود به مسئولین بهداشتی درمانی کشور کمک نماید تا با برنامه ریزی های دقیق تری به منظور پیشگیری و درمان سریع این مشکلات تمییزات مقتضی اتخاذ گردد. اهداف مطالعه، شامل تعیین میزان مشکلات مرتبط با سلامتی مادران طی ۴۵ روز بعد از زایمان و تعیین ارتباط تعداد و نوع زایمان با مشکلات سلامتی مادران در طی این دوره می‌باشد.

**روش کار**

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی بود که در آن وجود مشکلات مربوط به سلامتی مادران طی ۶ هفته اول بعد از زایمان مادران و ارتباط بین نوع و تعداد زایمان با این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور نمونه گیری ۱۳۳۰ مادر که به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های بهداشتی منتخب شهرستان تبریز (۴۴ مرکز) چیت واکسیناسیون ۴۵ روزگی کودکان خود مراجعه نمودند، قبل از انجام واکسیناسیون کودک خود مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سه قسمتی بود سوالات قسمت اول در

اگر چه صاحب‌نظران اظهار داشته‌اند، به طور معمول ۶ هفته بعد از زایمان تغییرات ناشی از حاملگی به حالت اول بر می‌گرددند، ولی اغلب این طور نبوده و بسیاری از مشکلات مربوط به سلامتی مادر ماها بعد از زایمان همچنان باقی می‌مانند. هر چند که این مشکلات حاد یا تهدید کننده زندگی مادر نیستند، اما تأثیر بالقوه آن‌ها بر عملکرد روزانه مادر (مراقبت از کودک، روابط بین فردی، کار) بی‌اهمیت نمی‌باشد (Who, ۱۹۹۸). سالانه حدود ۶۰ هزار زن در اثر مشکلات ناشی از حاملگی در سراسر جهان می‌میرند و ۹۹ درصد از این تعداد مرگ در کشورهای در حال توسعه به وقوع می‌پیوندد که بیش از ۵۰ درصد از آن مربوط به دوره بعد از زایمان می‌باشد (Leah, ۲۰۰۰). مشکلات مادری به خصوص در کشورهای در حال توسعه بسیار بالا بوده و حدوداً ۲۰-۴۰ برابر بیشتر از مرگ و میر مادری است (McGinn و Maine, ۲۰۰۰).

سنجدش مشکلات مربوط به سلامتی مادران به دلایل متعددی است: تعریف استانداردی از مشکلات مرتبط با سلامتی مادری وجود ندارد و اگر هم تعریفی باشد، بر اساس نظرات مولفین متفاوت بوده و معیار تشخیص بیماری‌ها نیز متفاوت می‌باشد (McGinn و Maine, ۲۰۰۰).

از طرفی هیچ الگوی خاصی برای ارزیابی‌های مکرر به عنوان فرصت‌های استاندارد مراقبت دوره‌ای وجود ندارد (Lumely و Brown, ۱۹۹۳). به همین دلایل مشکلات بعد از زایمان را به عنوان عوارض مخفی شده می‌نامند (Who, ۱۹۹۸). در مندرجات آموزشی (پزشکی، مامایی و پرستاری) مربوط به دوره بعد از زایمان به طور مشخص بر مداخلات اولیه ای مثل

سازارین انتخابی داشتند. تنها در ۵ مورد (۴٪ درصد) زایمان با فورسپس و واکیوم صورت گرفته بود. اغلب مادران (۶۷٪/۶ درصد) در بیمارستان دولتی زایمان کرده بودند. ۵۲٪/۸ درصد مادران تنها یک بار زایمان کرده بودند. ۸۹٪ درصد مادران در طی ۶ هفته بعد از زایمان حداقل یک مشکل را تجربه کرده بودند.

نتایج حاکی از آن بود که شایع ترین مشکلات در طی ۴۵ روز بعد از زایمان که نمونه ها از آن شاکی بودند کمردرد (۵۲٪/۷ درصد) و کمترین مشکل (۲٪/۱ درصد) بی اختیاری ادرار بود (جدول شماره ۱).

زمینه ویژگی های فردی و اجتماعی، سوالات قسمت دوم در زمینه تاریخچه بارداری مادران و سوالات قسمت سوم در ارتباط با تعیین میزان وجود مشکلات سلامتی مادران در طی ۴۵ روز اول بعد از زایمان بود.

## نتایج

میانگین سنی مادران مورد پژوهش  $26.5 \pm 5.6$  و میانگین تعداد حاملگی ها  $1.27 \pm 1.27$  بود. ۳۴٪/۲ درصد مادران دارای تحصیلات دبیرم و ۶٪/۸ درصد بی سواد بودند. و از نظر شغلی ۹٪/۵ درصد مادران خانه دار بودند. ۲۹٪/۷ درصد سازارین اورژانسی و ۲۸٪/۵ درصد

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی مشکلات مادران در طی ۶ هفته اول بعد از زایمان (n=۱۳۳۰)

نوع مشکل	بله		خیر		نوع مشکل
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	
سردرد	(۶۶۶) ۵۰٪/۱	(۶۶۶) ۴۹٪/۹	(۶۶۴) ۴۹٪/۹	(۷۴۰) ۵۵٪/۶	خستگی
کمر درد	(۶۲۹) ۴۷٪/۳	(۶۲۹) ۵۲٪/۷	(۷۰۱) ۵۲٪/۷	(۱۰۱۰) ۷۵٪/۹	غم و اندوه بیش از حد
عفونت محل بخیه ها	(۱۲۰۲) ۹۰٪/۴	(۱۲۸) ۹٪/۶	(۱۲۳۲) ۹۲٪/۶	(۹۸) ۷٪/۴	عارض ناشی از بی حسی و بیهوشی
بیوست	(۹۷۶) ۷۳٪/۴	(۳۵۴) ۲۶٪/۶	(۱۲۵۸) ۹۴٪/۴	(۷۲) ۵٪/۴	مشکلات مربوط به روابط جنسی
مشکلات پستان	(۱۱۳۹) ۸۵٪/۶	(۱۹۱) ۱۴٪/۴	(۱۱۴۹) ۸۶٪/۴	(۱۸۱) ۱۳٪/۶	مشکلات خواب
خونریزی غیر طبیعی	(۱۲۵۷) ۹۴٪/۵	(۷۳) ۵٪/۵	(۱۱۹۶) ۸۹٪/۹	(۱۳۴) ۱۰٪/۱	هموروئید
مشکلات تخلیه مثانه	(۱۲۹۳) ۹۷٪/۲	(۳۷) ۲٪/۸	(۱۲۱۰) ۹۱٪/۰	(۱۲۰) ۹٪/۰	عفونت دستگاه ادراری
بی اختیاری ادراری	(۱۳۰۲) ۷۹٪/۹	(۲۸) ۲٪/۱	(۱۲۸۵) ۹۶٪/۶	(۴۵) ۳٪/۴	سایر مشکلات*

\*سایر مشکلات شامل سرگیجه / ضعف، شکم درد / نفخ دردهای عضلانی، مشکلات داخلی، مشکلات ادراری - تناسلی

(۳) نشان می دهد از نظر بروز عفونت محل بخیه ها، بیوست، مشکلات پستان، بی اختیاری ادراری و ترشحات غیر طبیعی واژینال در طی ۴۵ روز بعد از زایمان اختلاف معنی دار آماری بین مادران با زایمان واژینال و غیر واژینال وجود دارد. در مورد سردرد، کمردرد، خونریزی غیر طبیعی، مشکلات تخلیه مثانه، خستگی، غم و مشکلات جنسی، مشکلات خواب، هموروئید و سایر موارد اختلاف موجود بین دو گروه معنی دار نمی باشد.

همچنین براساس اطلاعات جدول شماره (۲) از نظر بروز عفونت دستگاه ادراری و خستگی اختلاف معنی دار آماری بین مادران اول زا و چند زا وجود دارد. در مورد سردرد، کمردرد، عفونت محل بخیه ها، بیوست، مشکلات پستان، خونریزی غیر طبیعی، مشکلات تخلیه مثانه، بی اختیاری ادراری، ترشحات غیر طبیعی واژینال، غم و اندوه، مشکلات جنسی، مشکلات خواب، هموروئید و سایر موارد اختلاف معنی داری بین مادران اول زا و چند زا دیده نشد. همان طور که اطلاعات جدول شماره

جدول شماره ۲ - توزیع فراوانی مشکلات سلامتی به تفکیک تعداد زایمان (n=۱۳۳۰)

مشکلات	تعداد زایمان				تعداد زایمان				مشکلات	
	۱		۲ و بیشتر		۱		۲ و بیشتر			
	۶۹	۷۶	۶۹	۷۶	۶۹	۷۶	۶۹	۷۶		
<b>مشکلات</b>										
سردرد	۰/۰۵۰	۰/۱۰۱	۰/۸۶۶	۰/۳۵۲	۰/۰۸۶	۰/۳۵۲	۰/۵۱۳	۰/۳۲۲	۰/۴۸۷	
بله	۸/۸	۵۵	۹/۳	۶۵	بله	۵۱/۳	۳۲۲	۴۸/۷	۲۴۲	
خیر	۹۱/۲	۵۷۳	۹۰/۷	۶۳۷	خیر	۴۸/۷	۳۰۶	۵۱/۳	۳۶۰	
کمردرد	۰/۷۸۱	۰/۷۷۸	۰/۸۴۲	۰/۲۸	۰/۲۸	۰/۷۷۱	۰/۸۵	۰/۴۹/۹	۰/۳۵۰	
بله	۱۱/۳	۷۱	۱۰/۸	۷۶	بله	۴۴/۱	۲۷۷	۵۰/۱	۳۵۲	
خیر	۸۸/۷	۵۵۷	۸۹/۲	۶۲۶	خیر	۵۵/۹	۳۵۱	۴۹/۹	۳۵۰	
عفونت محل بخیه‌ها*	۰/۰۱۳	۶/۱۴۰	۰/۷۷۱	۰/۰۸۵	۰/۰۸۵	۰/۰۷۷۱	۰/۰۸۵	۰/۶۲	۰/۶۶	
بله	۴۷/۹	۳۰۱	۴۱/۲	۲۸۹	بله	۹/۹	۶۲	۹/۴	۶۶	
خیر	۵۲/۱	۳۲۷	۵۸/۸	۴۱۳	خیر	۹۰/۱	۵۶۶	۹۰/۶	۶۳۶	
پیوست	۰/۰۵۱۲	۰/۴۲۹	۰/۶۳۲	۰/۰۲۲۹	۰/۰۲۲۹	۰/۰۶۳۲	۰/۰۲۲۹	۰/۲۷/۲	۰/۱۸۳	
بله	۲۲/۲	۱۴۶	۲۴/۸	۱۷۴	بله	۷۲/۸	۴۵۷	۷۳/۹	۵۱۹	
خیر	۷۶/۸	۴۸۲	۷۵/۲	۵۲۸	خیر	۱۴/۲	۸۹	۱۴/۵	۱۰۲	
مشکلات پستان	۰/۰۲۲۵	۱/۴۷۱	۰/۰۸۵۳	۰/۰۳۵	۰/۰۸۵۳	۰/۰۸۵۳	۰/۰۸۵۳	۰/۸۵	۰/۸۰	
بله	۴/۶	۳۹	۶/۱	۴۳	بله	۸۵/۸	۵۳۹	۸۵/۵	۶۰۰	
خیر	۹۵/۴	۵۹۹	۹۳/۹	۶۵۹	خیر	۵/۱	۳۲	۵/۸	۴۱	
خونریزی غیر طبیعی	۰/۰۸۰۶	۰/۶۰	۰/۰۵۵۲	۰/۰۳۵۵	۰/۰۵۵۲	۰/۰۳۵۵	۰/۰۵۵۲	۰/۳۵	۰/۳۵	
بله	۱۳/۹	۸۷	۱۳/۴	۹۴	بله	۹۴/۹	۵۹۶	۹۴/۲	۶۶۱	
خیر	۸۶/۱	۵۴۱	۸۶/۶	۶۰۸	خیر	۳/۰	۱۹	۲/۶	۱۸	
مشکلات تخالیه مثانه	۰/۰۳۸۸	۰/۷۴۴	۰/۰۶۱۰	۰/۰۲۶۱	۰/۰۶۱۰	۰/۰۶۱۰	۰/۰۶۱۰	۰/۹۷/۲	۰/۶۴۸	
بله	۱۰/۸	۶۸	۹/۴	۶۶	بله	۶۰/۹	۶۰۹	۹۷/۴	۶۴۸	
خیر	۸۹/۲	۵۶۰	۹۰/۶	۶۳۶	خیر	۹۷/۵	۶۱۲	۹۸/۳	۶۹۰	
پی اختیاری اداری	۰/۰۲۳۵	۰/۲۰۶	۰/۰۲۸۸	۰/۱۱۳۰	۰/۰۲۸۸	۰/۰۲۸۸	۰/۰۲۸۸	۰/۱۱۳۰	۰/۱۱۳۰	
بله	۳۵	۵۳/۰	۲۴	۴۷/۰	بله	۲/۵	۱۶	۱/۷	۱۲	
خیر	۴۷/۰	۶۰۴	۵۳/۰	۶۸۱	خیر	۹۷/۵	۶۱۲	۹۸/۳	۶۹۰	

\* در زایمان واژینال تنها کسانی که اپنی زیاتومی شده بودند، در نظر گرفته شد.

\*\* مواردی که جمع کل به ۱۳۳۰ نمی‌رسد موارد نامعلوم می‌باشند.

است ماه‌ها بعد از زایمان هم مادران این مشکلات را دارند. Cleland و Bathia (۱۹۹۳) نیز متوجه شدند ۸۷ درصد مادران در ۸ هفته بعد از زایمان حداقل یک مشکل سلامتی داشتند. در مطالعه‌ای که در هنگ‌کنگ در سال ۲۰۰۰ توسط Levy و همکاران انجام شد نتایج نشان داد که در طی ۸ هفته اول بعد از زایمان بسیاری از زنان مشکلاتی را تجربه می‌کنند.

در ارتباط با هدف اول تعیین فراوانی مشکلات مربوط به سلامتی مادران ۴۵ روز بعد از زایمان ۸۹ درصد از مادران طی ۴۵ روز اول بعد از زایمان حداقل یک مشکل را تجربه کرده بودند. Lumely و Brown (۱۹۹۳) متوجه شدند ۹۴ درصد مادران طی ۷ ماه بعد از زایمان دچار مشکل بودند که نشان دهنده این

### بحث و نتیجه گیری

جدول شماره ۳- توزیع فراوانی مشکلات سلامتی مادران به تفکیک نوع زایمان (n=۱۳۳۰)

نوع زایمان	فرابویانی مشکلات								نوع زایمان
	P	X <sup>2</sup>	غيرواژینال	واژینال	P	X <sup>2</sup>	غيرواژینال	واژینال	
			نوع زایمان	فرابویانی مشکلات			نوع زایمان	فرابویانی مشکلات	
<b>سردرد</b>									
۰/۵۴۷	۰/۳۶۲				۰/۴۰۱	۰/۷۰۶			
۸/۷	۶۷	۹/۶	۵۳	بله		۴۸/۸	۳۷۸	۵۱/۲	۲۸۲
۹۱/۳	۷۰۷	۹۰/۴	۴۹۸	خیر		۵۱/۲	۳۹۶	۴۸/۸	۲۶۹
<b>کمردرد</b>									
۰/۰۳۷	۴/۳۶				۰/۱۴۹	۲/۱۹۲			
۹/۴	۷۳	۱۳/۱	۷۲	بله		۵۴/۴	۴۲۱	۵۰/۳	۲۷۷
۹۰/۶	۷۰۱	۸۶/۹	۴۷۹	خیر		۴۵/۶	۳۵۳	۴۹/۷	۲۷۴
<b>عفونت محل بخیه ها*</b>									
۰/۴۰۱	۰/۷۰۴				۰/۰۰۱	۰/۶۸۵			
۴۴/۴	۳۳۶	۴۵/۷	۲۵۲	بله		۱۰	۸/۳	۶۴	۱۴/۸
۵۵/۶	۴۳۸	۵۴/۳	۲۹۹	خیر		۹۱/۷	۷۱۰	۸۵/۲	۲۷۶
<b>بیوست</b>									
۰/۳۴۸	۰/۸۷۹				۰/۰۰۱	۰/۲۵۸			
۲۳/۰	۱۷۸	۲۵/۲	۱۳۹	بله		۱۰	۲۶/۶	۲۳۱	۲۲/۰
۷۷/۰	۵۹۶	۷۴/۸	۴۱۲	خیر		/۲	۵۳۴	۷۸/۰	۴۳۰
<b>مشکلات پستان</b>									
۰/۴۵۳	۰/۵۶۶				۰/۰۳۹	۴/۲۸۲			
۵/۰	۳۹	۶/۰	۳۳	بله		/۰	۱۲۴	۱۲/۰	۶۶
۹۵/۰	۷۳۵	۹۴/۰	۵۱۸	خیر		۱۶	۶۵۰	۸۸/۰	۴۸۵
<b>خونریزی غیر طبیعی</b>									
۰/۶۷۶	۰/۱۷۵				۰/۳۷۳	۰/۷۹۲			
۱۳/۲	۱۰۲	۱۴/۰	۷۷	بله		۵/۰	۳۹	۶/۲	۳۴
۸۶/۸	۶۷۲	۸۶/۰	۴۷۴	خیر		/۰	۷۳۵	۹۳/۸	۵/۷
<b>مشکلات تخلیه مثانه</b>									
۰/۲۰۰	۱/۶۴۵				۰/۰۱۷				
۱۰/۹	۸۴	۸/۷	۴۸	بله		۲/۸	۲۲	۲/۷	۱۵
۸۹/۱	۶۹۰	۹۱/۳	۵۰۳	خیر		۹۷/۲	۷۵۲	۹۷/۳	۵۳۶
<b>بی اختیاری ادراری</b>									
۰/۴۲۸	۰/۲۰۱				۰/۰۰۱	۰/۴۸۸			
۳۰	۴۲/۱	۳۳	۵۷/۹	۱۲	بله	۱۰	۱/۰	۸	۳/۶
۵۷/۹	۷۴۱	۴۲/۱	۵۳۹	خیر		/۰	۷۶۶	۹۶/۴	۵۳۱

\* در زایمان واژینال تنها کسانی که اپی زیاتومی شده بودند، در نظر گرفته شد.

\*\* مواردی که جمع کل به ۱۳۳۰ نمی رسد موارد نامعلوم می باشند.

جنسی از طرف مادر بخاطر خجالت به ماما یا مراقب بهداشتی گزارش نمی شود و این حالت ممکن است در جامعه ما نیز صادق باشد. در ارتباط هدف دوم، تعیین ارتباط تعداد و نوع زایمان با وجود برخی از مشکلات مرتبط با سلامتی مادر در طی ۴۵ روز بعد از زایمان نتایج تحقیق نشان داد که از نظر بروز عفونت محل بخیه ها، بیوست، مشکلات پستان، بی اختیاری ادراری و ترشحات غیرطبیعی واژینال در طی ۴۵ روز بعد از زایمان اختلاف معنی دار آماری بین مادران با زایمان واژینال و غیرواژینال وجود دارد به طوری که ترشحات غیرطبیعی واژینال و عفونت محل بخیه ها و بی اختیاری ادراری در مادران با زایمان واژینال بیشتر و بیوست و مشکلات پستان در زنان با زایمان غیر واژینال بیشتر بود. از نظر تعداد زایمان کمردرد و خستگی در مادران چندزا شایعتر بود.

(Templeton و Strud, Abdalla, Glanzener ۱۹۹۵) نیز در نتایج مطالعه خود متوجه شدند بی اختیاری ادراری، هموروئید، مشکلات جنسی و درد پرینه در مادرانی که زایمان غیر واژینال داشتند، کمتر بود. درد پرینه و مشکلات جنسی در زنان اول زا بیشتر بود. در مطالعه حاضر زنان چندزا خستگی و کمردرد بیشتری گزارش کردند اما در مطالعه Lee در سال ۲۰۰۰ در پنسیلوانیا زنان اول زا خستگی و مشکلات خواب بیشتری گزارش کرده اند. Gennaro (۲۰۰۰) می نویسد، زنان اول زا کمتر در کارهای منزل مشارکت می کنند، بر عکس زنان چندزا که به علت سطح بالای عملکرد در کارهای روزمره و اضافه شدن یک فرد به اعضای خانواده که باعث افزایش حجم کار منزل شده دارای خستگی بیشتر و عدم کفایت خواب می شوند. در این مطالعه نیز زنان چندزا کمردرد بیشتری تجربه کرده بودند علت این امر احتمالاً حجم

در مطالعه حاضر شایع ترین مشکل کمردرد و کمترین مشکل بی اختیاری ادراری بود. اما در تحقیقی که در Lumely Brown و Templeton (۱۹۹۵) در انگلستان توسط (۶۹٪ درصد)، و کمترین مشکل بی اختیاری ادراری (۱۰٪ درصد) بود. Abdalla, Glanzener و Strud (۱۹۹۳) در نتایج مطالعه خود متوجه شدند شایع ترین مشکل خستگی (۵۹٪ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به مشکلات تخلیه مثانه بود. کمردرد علل مختلفی دارد. کمردرد خفیف متعاقب فشار زیاد یا خستگی و خم شدن، بلند کردن اشیا یا پیاده روی به وجود می آید. سابقه کمردرد قبلی و چاقی از عوامل مستعد گنده هستند. برخی زنان مبتلا به کمردرد به پوکی استخوان توام با بارداری مبتلا می باشند (Williams, Cunningham, Gant, Leveno و Lewis, McArthur ۱۹۹۳). در تحقیقی که در انگلستان توسط Knox در سال ۱۹۹۳ بر روی مادران آسیایی و قفقازی انجام شد مادران آسیایی در مقایسه با مادران قفقازی کمردرد، سردرد، دردهای عضلانی بیشتری داشتند. بی اختیاری ادراری در بررسی حاضر همانند بررسی انجام گرفته در انگلستان توسط Brown و Lumely (۱۹۹۳) کمترین مشکل ذکر شده توسط مادران بود اما در بررسی حاضر این درصد پایین تر بود (۲٪ درصد در مقابل ۷٪ درصد). در مورد مشکلات جنسی و هموروئید هم درصد گزارش شده در مقایسه با تحقیقات انجام گرفته توسط Brown و Strud, Abdalla, Glanzener (۱۹۹۳) و Templeton (۱۹۹۵) پایین تر بوده است. Lumely در سال ۱۹۹۳ معتقدند، این امر ممکن است با مسائل فرهنگی جوامع ارتباط داشته باشد. چون در برخی جوامع مسائلی مثل مشکلات گوارشی، ادراری،

کار بیشتر زنان چندزا در منزل می باشد، حجم کار زیاد سبب خستگی شده و خستگی می تواند موجب کمردرد گردد و در این تحقیق مادران چندزا خستگی بیشتری تجربه کرده بودند در نتیجه کمردرد هم در این گروه بیشتر دیده شده است.

#### منابع

- Bhatia, J., & Cleland, J. (1995). Self reported symptoms of gynecological morbidity and their treatment in South India. Studies in family planning. 26(4), 203-15.
- Brown, S., Lumely, J. (1998). Maternal health after childbirth: Results of an Australian population based survey. Br J Obstet Gynaecol. 105, 156-6.
- Cunningham, F.G., Gant, N., Leveno, K., Gilstrap, L. (2001). Williams Obstetrics. (21<sup>st</sup> ed.). NewYork: McGraw-Hill Company. 361-384, 221-250, 403-25, 619-670, 1339-1380.
- Gennaro, S. (2000). Health Behaviors in PostPartum women and community Health, (Internet).
- Glanzener, C., Abdalla, M., Strud, P., Templeton, A., Russel, T. (1995). Postnatal maternal morbidity: extent, cause, prevention and treatment. J Obstet Gynecol. 2, 282- 7.
- Leah, A. (2000). Health problem after child birth. Journal Midwifery Women's Health. 45(1), 55-7.
- Lee, K.A., Ellen zaffke, M., Mcnany, G. (2000). Parity and sleep patterns during and pregnancy. Obstet Gynecol, 95(1), 14-8.
- Maine, D., & McGinn, T. (2000). Maternal Mortality and Morbidity. In: Goldman M. Hatch M. editores. Women & Health. (1<sup>st</sup> ed.). London: Academic Press. 395-403.
- Maternal and newborn health/safe motherhood unit/Division of reproductive. Health postpartum care of the mother and newborn a practical guide. WHO/RHT/MSM/ 98(3), 6, 12, 61.
- Mc Arthur, C., Lewis, M., Knox, E.G. (1993). Comparison at long-term Health problems following child birth among Asian and Caucasian mothers. Br J Gen Pract. 43(377), 519-22.

## MATERNAL MORBIDITY WITHIN 45 DAYS AFTER DELIVERY

\**M. Roohi, MS<sup>1</sup>*    *S. Mohammad alizadeh, MS<sup>2</sup>*

### ABSTRACT

It is estimated that about 6 week, after delivery mothers would recover from many change of pregnancy. But, some difficulties will remain and effect daily avidities, child care, household responsibilities and working outdoor are examples of these hardships, mostly, both mothers and health care providers do not pay attention to them. So, health problem after delivery have been called "hidden morbidity".

Therefore, in a descriptive study the researcher assessed post partum morbidities, and the prevalence of depression and fatigue in this group, and to do so, 1330 mothers were interviewed 45 days after delivery while they reffered for the immunization of their babies.

Finding showed that 89% of the sample group pointed on one or more problems within 6 weeks post partum. The problems reported by mothers included: backache (52.7%), headache (49.9%), fatigue (44.4%), constipation (26.6%), postpartum blue (24.1%), breast problem (14.4%), sleep disorder (13.6%), abnormal vaginal discharge (11.1%), hemorrhoids (10.1%), stitches infection (9.6%), urinary tract infection (9.0%), side effect of anesthesia (7.4%), abnormal vaginal bleeding (5.5%), sexual problems (5.4%), urinary incontinence (2.1%), difficulty voiding (2.8%) and other problems (3.4%).

So, with such a large variety of postpartum health problems quality and quantity of care is to be considered. At antenatal care, mother and her family should be educated about post partum health problems, and health care providers should assess mothers thoroughly.

**Key words:** postpartum, maternal morbidity

<sup>1</sup> Senior Lecturer, Mahabad Islamic Azad University, Mahabad, Iran. (\*Corresponding Author)

<sup>2</sup> Senior Lecturer, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.