

مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهاي کاري در مراقبت‌هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و مدیران آن‌ها

*دکتر منیره انوشه^۱ دکتر فضل‌ا... احمدی^۲ دکتر سقراط فقيه زاده^۳ مجتبی ويس مرادي^۴

چكیده

زمينه و هدف: خطاهاي کاري از موارد احتماب ناپذير در كليه حرفه‌ها از جمله حرفه‌هاي پيداشتني و درمانني مي باشند. بررسی علل اين خطاها، اولين قدم در طراحی برنامه کنترل و کاهش خطاهاي کاري در مراقبت‌هاي پرستاري مي باشد. هدف اين مطالعه مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهاي کاري در مراقبت‌هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و مدیران آن‌ها و بررسی اهميت ابعاد مختلف زمینه ساز اين خطاها در بخش‌هاي مختلف در سال ۱۳۸۵ بود.

روش بررسی: اين پژوهش مطالعه‌اي توصيفي تحليلي است. نمونه‌هاي پژوهش شامل ۹۶ نفر پرستار و مدیر پرستاري شاغل در ۳ بيمارستان آموزشي منتخب سطح شهر تهران از طريق نمونه‌گيري خوشماي بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و برای تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (توزيع فراوانی درصد پاسخ‌ها) و آزمون کاي اسکوئير استفاده گردید.

يافته‌ها: نتائج پژوهش نشان مي‌دهد که از ديدگاه پرستاران و مدیران آن‌ها، عوامل مختلفي در هر يك از ابعاد مديريت، محيطي، مراقبت و پرستاري زمینه ساز بروز خطاهاي کاري مي باشد. همچنين بين بخش‌هاي مختلف از لحاظ عوامل ايجاد کننده اين خطاها، با استفاده از آزمون کاي اسکوئير تفاوت معنيداری وجود داشت ($P < 0.01$).

نتيجه گيري: با توجه به اين که ريشه کنی و از بين بردن خطاهاي کاري صد درصد امكان پذير نمي باشد، بنابراین تلاش برای کاهش دادن و کنترل آن‌ها، منوط بر استفاده از رو يك در سистемي با تأكيد بر ابعاد مديريت، محيطي، مراقبت و پرستاري برای بررسی عوامل زمینه‌ساز و برنامه ريزی برای رفع اين عوامل مي باشد.

کليد واژه‌ها: خطاهاي کاري - علل زمینه ساز - مراقبت پرستاري - پرستاران - مدیران پرستاري

تاریخ دریافت: ۱۵/۰۲/۸۶ تاریخ پذیرش: ۰۵/۱۰/۸۶

^۱ استاديار گروه آموزش پرستاري، دانشكده علوم پزشكى، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران(*مؤلف مسئول)

^۲ دانشيار گروه آموزش پرستاري، دانشكده علوم پزشكى، دانشگاه تربیت مدرس

^۳ استاد گروه آمار حياتي، دانشكده علوم پزشكى، دانشگاه تربیت مدرس

^۴ کارشناس ارشد آموزش پرستاري، دانشكده علوم پزشكى، دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

درصد، (وابسته به میزان و خامت متصور از خطا) می‌باشد.^(۱) درنهایت این میزان‌ها هر چقدر که باشند، طبق گفته Kuhn و Youngberg، تعداد واقعی آن‌ها اهمیت کمتری از این حقیقت دارد که یک نفر می‌میرد یا صدمه می‌بیند.^(۲) از میان ۲۰۰ مورد سوء عملکرد در سال ۱۹۹۰، نتایج بررسی‌ها نشان داد که بخش عمده این سوء عملکردها به دلیل فقدان استقلال، تمامیت و خود کارایی در پرستاران بوده است، که منجر به کاهش سطح صلاحیت عملکردی آن‌ها شده و استهلاک و هدر رفتن هزینه‌ها را افزایش داده است.^(۳) مطالعات مختلف نیز در جهت برآورد میزان مشکل در زمینه اشتباهات پزشکی و پرستاری انجام شده است؛ مطالعه فعالیت پزشکی هاروارد نشان داده است که بیش از ۷۰ درصد رخدادهای زیان‌آور برای بیمار، ثانویه به غفلت کلیه کارکنان درمانی و مراقبتی بوده که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها قابل پیشگیری بوده‌اند. بررسی‌های دیگر در این زمینه نشان داد که مراقبت پیدا شتی از دیدگاه مردم نسبتاً ایمن و سالم فرض می‌شود و ۷۵ درصد آن‌ها گفته‌اند که در مورد احتمال وقوع خطاهای طبی و مراقبتی نگران هستند و بیش از ۴۲ درصد آن‌ها در صحبت‌های خود بیان کرده بودند که خود یا یکی از دوستان یا اقوامشان تجربه یک مورد خطای طبی را داشته‌اند. نتایج تحقیق دیگر نشان داد که ۵۱ درصد افراد معتقد‌اند این‌یعنی کارهای پزشکی در طی دوره بستری آن‌ها کمتر از حد عالی بوده و ۳۹ درصد دیگر تجربه حداقل یک خطای پزشکی و مراقبتی را در دوره بستری خود داشته‌اند.^(۴) شورای بین المللی پرستاران می‌گوید: سلامت بیمار برای بیبود کیفیت مراقبت پرستاری ضروری است و تمام پرستاران مسئولیت اساسی جهت حفظ این‌یعنی بیمار در تمام جهات مراقبت را دارند؛ که شامل آگاه ساختن بیمار و

خطاهای پرستاری (Nursing errors) نظیر خطاهای که حین دارو دادن یا مراقبت از بیمار رخ می‌دهند، مشکل شناخته شده و موردی است که در سیستم بهداشتی و درمانی وجود دارد. ولی اهمیت آن در پیدا شت و درمان از این جهت است که بر عکس خطاهای موجود در سایر مشاغل، ممکن است نتایج جبران ناپذیری در پی داشته باشد؛ بنابراین از اهمیت بالاتری نیز برخوردار است. لغت خطا (Error) از کلمه قدیمی و به لفظ فرانسوی Erren به معنی سرگردان شدن و منحرف شدن (To wander or to stray) ۲۰۰۶ گرفته شده است و در دیکشنری آکسفورد سال ۲۰۰۶ به معنی خطا است و بیانگر وضعیت و حالت اشتباه کردن در فعالیت یا قضایت فرد می‌باشد. Reason یکی از صاحب‌نظران و نظریه پردازان اشتباهات کاری پرستاری معتقد است: خطا، اصطلاحی عملیاتی است که به موجب رخداد آن، زنجیره برنامه‌ریزی شده فعالیت‌های فیزیکی و ذهنی در رسیدن به هدف (درمان، ارتقاء سلامت و...) عاجز می‌مانند و این قصور و خطا به مداخله شناس نسبت داده نمی‌شوند.^(۱)

از ابتدای سال‌های دهه ۱۹۹۰ تاکنون، مطالعات انجام شده در ایالات متحده، انگلستان و استرالیا نشان داده‌اند که بین ۴ تا ۱۶/۶ درصد بیماران از نوعی صدمه (شامل ناتوانی دائم یا مرگ)، در نتیجه حوادث رخ داده از خطاهای پرسنل بیمارستانی رنج می‌برند. این مطالعات همچنین نشان داده‌اند که درصد عمدت‌های (حدود ۵۰ درصد) از این صدمات گزارش شده، قابل پیشگیری بوده‌اند که به همین دلیل تحت عنوان رویدادهای زیان‌آور قابل پیشگیری خوانده می‌شوند. در کل، میانگین میزان گزارش خطاهای بین ۱۵ درصد تا ۴۸

میزان آموژش و رضایت بیماران، میزان خطاهای کاری نیز به عنوان یکی نشانگرهای سودمندی کار پرسنل درمانی و مراقبتی برای آن مدیریت مهم می‌باشد.^(۷) به صورت ساده تر در ایالات متحده امریکا، پرستاران پیروی از عهدنامه Nightingale که اولین قانون آن این است: اول، آسیب نرسان، را دشوار می‌یابند. مطابق با اطلاعات ثبت شده ملی و ایالتی امریکا، پرستاران کارشناس مسئول بیشتر مرگ‌ها و صدمات هر ساله نسبت به دیگر متخصصین مراقبت بهداشتی هستند. چون زمان بیشتری را نسبت به سایرین با بیماران صرف می‌کنند. بنابراین به عنوان گروه اصلی برای برنامه‌ریزی در کاهش خطاها کاری مدد نظر می‌باشند.^(۸) در کشور ایران نیز داده‌ها و اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای از علل خطاها و انواع آن وجود ندارد و تنها اطلاعات جسته و گریخته‌ای در مورد وقوع خطاهای کاری وجود دارد؛ مثلاً پژوهشی توصیفی- مقطعي توسط پنجوینی تحت عنوان بررسی میزان و نوع اشتباهات دارویی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموژشی شهر سنندج در سال ۱۳۸۰، روی ۴۰ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های سنندج انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که توسط پرسشگران در ساعت‌دادن دارو، تکمیل شده و روز بعد توسط پژوهشگر موارد اشتباه از آن استخراج می‌شد. یافته‌ها نشان داد که اکثر اشتباهات دارویی در روش‌های وریدی، عضلانی و خوراکی به صورت حذف دارو و سپس دوزاژ اشتباه دارو بوده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه کل اشتباهات دارویی ۱۶/۷ درصد و اکثر اشتباهات مربوط به حذف دارو و دوزاژ نابجا بوده است و افزایش تعداد بیماران وجود بیمار بدحال نیز در افزایش تعداد اشتباهات نقش داشته است.^(۹) ولی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مشکل بروز خطاها

همکاران در مورد احتمال خطر و روش‌های کاهش خطرات، حمایت از اینمی بیمار و گزارش دادن رخدادهای نابجا به یک فرد مسئول می‌باشد. همچنین ادامه می‌دهد تشخیص اولیه خطر، کلید پیشگیری از صدمه به بیمار است و به نگهداری فرهنگ اعتماد، شرافت و تمامیت و ارتباط باز بین بیمار و فراهم کنندگان سیستم مراقبت بهداشتی کمک می‌کند.^(۱۰) بر طبق مطالعه انجمن پزشکی امریکا، روزانه حداقل ۱۰۰ بیمار در ایالات متحده امریکا به دلیل خطاها کاری می‌میرند. مطالعه اینمی بیمار و خطاها پزشکی در ۱۲ بیمارستان روسایی در ۱۲ ایالت نشان داد که ۹۰ درصد کارمندان بیمارستان معتقدند که سلامت بیمار مسئولیت اولیه پرستاران است. تنها ۲۲ درصد شرکت‌کنندگان مطالعه معتقد بودند که اینمی بیمار مسئولیت مشترک پزشک، پرستار، و... است. یکی از پژوهشگران در مطالعه قبلی خود دریافت که فقط ۸ درصد پزشکان، پرستاران را در تصمیم گیری مراقبت از بیمار به حساب می‌آورند و این در حالی است که بیشترین علل خطاها کاری در طبقه خطاها پرستاری طبقه‌بندی می‌شود. همچنین مطابق با نظریات مختلف، این نتایج نشانگر شکاف بین اعضا کلیدی تیم مراقبت بهداشتی است که اگر می‌خواهیم امنیت بیمار حفظ شود، بایستی حتماً این شکاف بر طرف شود و پرستاران نیز برنامه خود را برای کاهش خطاها و افزایش اینمی بیمار با برنامه‌های پزشکی هماهنگ کنند؛ در این زمینه محیط کاری بایستی گفتگوی باز بین کارکنان مراقبت بهداشتی را افزایش داده تا هدف کاهش و کنترل خطاها کاری به دست آید.^(۱۱) از نظر مدیریت سیستم بهداشتی و درمانی نیز خطاها کاری و بررسی میزان آن‌ها مهم است؛ چون همراه با ساعت مراقبت مستقیم، جایگزینی و جابه‌جایی پرستاران، غیبت،

مورد نظر در رابطه با علل زمینه ساز خطاها کاری را استخراج کرده و با توجه به ماهیت هر خطا یا علت آن، گوییها در ۳ حیطه یا بُعد مدیریتی، محیطی، مراقبت و پرستاری، و در ۲ بخش مشخصات دموگرافیک (۶ سؤال) و سؤالات علل خطاها کاری (۲۳ سؤال) طبقه‌بندی گردید. سپس جهت تعیین روابی پرسشنامه، یعنی اعتبار از روش اعتبار محتوى استفاده شد. جهت تعیین پایایی ابزار به دست آمده از مجموع مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از نظرات اساتید پرستاری و مدیران پرستاری بالینی، پژوهشگر با مراجعه به یکی از بیمارستان‌های آموزش سطح شهر تهران، از ۱۰ نفر از پرستاران، سرپرستاران و مدیران پرستاری خواست تا پرسشنامه را تکمیل نمایند و سپس با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی ابزار به میزان ۷۶٪ محاسبه گردید. در ادامه انجام پژوهش، پژوهشگران با کسب مجوزهای لازم از معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌های ذیربط، وارد محیط پژوهش گردیدند و پس از آگاه‌کردن کلیه واحدهای پژوهش از اهداف مطالعه و دادن اطمینان در مورد داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش، رازداری و عدم افشا نام و پاسخ‌های آنها، از پرستاران (به تعداد ۶۹ نفر، شاغل در بخش‌های ویژه (CCU، همودیالیز)، بخش گوش و حلق و بینی (ENT)، داخلی و جراحی و مدیران پرستاری (سرپرستاران و سوپر وایزرهای مترون‌ها) (به تعداد ۲۷ نفر) خواست تا پرسشنامه‌ها را با دقت تکمیل کنند. متغیر سنجش علل خطاها کاری در مراقبت‌های پرستاری بر اساس مقیاس لیکرتی (با مقیاس ۱ تا ۵) و از نوع رتبه‌ای بود؛ بنابراین پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها وارد کردن آنها به کامپیوتر، با نرم افزار آماری SPSS و با آمار توصیفی (درصد توافق: مجموع میزان‌های موافق و کاملاً موافق) و تحلیلی

پرستاری و پژوهشی مانند سایر کشورهای اروپایی و امریکایی، دامن گیر کشور ایران نیز می‌باشد و نیازمند بررسی علل ریشه‌ای و ارائه راه حل برای کنترل آنها می‌باشد. بنابراین اولین قدم کنترل خطاها کاری، تعیین علل زمینه ساز و رفع آنها می‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین علل زمینه ساز بروز خطاها کاری در مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران بوده است.

روش پژوهشی

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است، که به منظور تعیین علل زمینه ساز بروز خطاها کاری در مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران آنها در سال ۱۳۸۵ انجام شده است. جامعه این پژوهش کلیه پرستاران کارشناس و مدیران پرستاری (سرپرستاران و سوپر وایزرهای مترون‌ها) شاغل در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پژوهشی تهران، ایران و شهید بهشتی بود. جهت انجام نمونه‌گیری به صورت خوشبایی، لیست کلیه بیمارستان‌های آموزشی سطح شهر تهران که زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پژوهشی تهران، ایران و شهید بهشتی بودند تهیه گردید و ۳ بیمارستان (هر یک زیر مجموعه یکی از دانشگاه‌های علوم پژوهشی سطح شهر تهران) به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شد. جهت تعیین تعداد نمونه لازم، با توجه به مطالعه مقدماتی، نسبت درصد پاسخ کاملاً موافق به یکی از سؤالات پرسشنامه به دست آمد و پس از قرار دادن در فرمول محاسبه حجم نمونه، تعداد نمونه به تعداد ۹۶ نفر تعیین شد. ابزار مطالعه پرسشنامه بود. جهت تهیه و تدوین ابزار گردآوری داده‌ها پژوهشگران با مرور کتب و مقالات موجود در زمینه خطاها کاری پرستاری، گوییه‌های

و همچنین ۷۱/۹ درصد آن‌ها پرستار و ۹/۴ درصد سوپر وایزرهای مترون‌ها بودند. سابقه کار ۳۲/۳ درصد افراد مورد بررسی کمتر از ۵ سال و ۴/۲ درصد آن‌ها سابقه کار بین ۲۵ تا ۳۰ سال داشتند. همچنین حداقل سابقه کار ۱ سال و حداقل آن ۲۹ سال بود. از نظر نوع بخش ۲۱/۹ درصد واحدهای پژوهش در بخش جراحی عمومی و ۳/۱ درصد در بخش‌های داخلی و عفونی مشغول به کار بوده‌اند. مدرک تحصیلی ۹۳/۸ درصد آنها کارشناسی و بقیه کارشناسی ارشد بود. در جهت بررسی علل زمینه ساز بروز خطاها کاری در ابعاد مدیریتی، محیطی، مراقبت و پرستاری، درصد توافق (مجموع میزان‌های موافقت و کاملاً موافقم) از دیدگاه واحدهای مورد بررسی مشخص گردید که از بین گویه‌های موجود در پرسشنامه، مواردی که بالاترین اهمیت را از نظر پرستاران و مدیران پرستاری داشتند در جدول شماره ۱ آورده شده است.

(آزمون کای اسکوئر) تجزیه و تحلیل شد. همچنین تجارب بالینی پژوهشگران در مورد متفاوت بودن بخش‌های مختلف از نظر امکانات و تجهیزات، سبک‌های مدیریتی مدیران، و میزان توانمندی علمی و عملی پرستاران و مدیریت منابع انسانی و ... این ایده را به ذهن آورد تا به سؤال پژوهش که آیا علل زمینه ساز بروز خطاها کاری در بخش‌های مختلف متفاوت است، پاسخ‌گو بوده و متفاوت بودن علل بروز خطاها کاری در بخش‌های مختلف و تعیین عامل زمینه ساز اصلی از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری را در بخش‌ها توصیف نماییم.

یافته‌ها

یافته‌های پژوهش در زمینه مشخصات دموگرافیک نشان داد ۴۲/۷۵ درصد واحدهای پژوهش در دامنه سنی ۴۰-۳۰ سال قرار داشتند. همچنین کمترین سن ۲۳ سال و بیشترین سن ۵۰ سال بود. در زمینه جنس واحدهای پژوهش، ۹۸/۶ درصد زن و بقیه مرد بودند.

جدول شماره ۱- مهمترین علل زمینه ساز بروز خطاها کاری در مراقبت‌های پرستاری در هر بعد از دیدگاه پرستاران و مدیران آنها

اعداد	گویه‌ها	درصد توافق
مدیریت	عدم تأمین نیروی انسانی کافی (عدم تناسب بین تعداد پرستاران و بیماران)	۸۸/۵
برنامه ریزی نامناسب کاری (اجرای مراقبت‌های پرستاری بدون برنامه ریزی قبلی)	۸۲/۳	
تدوین شیفت‌های نامناسب کاری (عدم رعایت تناسب بین ساعات کاری پرسنل، ساعات کاری طولانی و انجام شیفت‌های متعدد)	۸۲/۳	
محیط	کمبود امکانات و تجهیزات مناسب (خرابی دستگاهها و تجهیزات لازم برای مراقبت‌های پرستاری نظیر فشار سنج، مانیتور ها، دستگاه ونتیلاتور)، لوازم تزریقات با کیفیت پایین و ...	۸۴/۴
مراقبت و پرستاری	شیفت کاری شبانه، پی در پی و با تعداد پرسنل کم	۸۴/۴
دوره بیستم / شماره ۱۳۸۶ / پاییز	انجام نقش‌های غیر مرتبط با نقش مراقبتی پرستار (مثلًاً فعالیت‌های دفتری روتین یا کاغذ بازی)	۸۰/۲
دوره بیستم / شماره ۱۳۸۶ / پاییز	کمبود آگاهی و دانش برای ارائه مراقبت صحیح (بروکسل های اجیاء، روش اجرای مراقبت‌ها، نحوه ارائه داروها، پایش اثرات و عوارض آنها و ...)	۷۷/۱

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری در مورد علل زمینه ساز بروز خطاها کاری در هر بُعد و هر بخش

دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری					بعضی از بخش‌های	بعضی از ابعاد
P -Value	جمع کل موافق و کاملاً موافق	بی نظر	مخالف و کاملاً مخالف		بخش	بعضی از ابعاد
	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)			
(100) ۵۱۷	(75/6) ۳۹۱	(7/7) ۴۰	(16/6) ۸۶		ویژه	
$\chi^2=44/261$ p < 0.001	(100) ۳۴۷	(73/8) ۲۵۶	(8/4) ۲۹	(17/9) ۶۲	جراحی عمومی و ENT	جراحی عمومی
	(100) ۲۲۶	(80/5) ۱۸۲	(4/9) ۱۱	(14/6) ۳۳	داخلي	داخلي
	(100) ۱۲۰	(57/5) ۶۹	(2/5) ۳	(40) ۴۸	مدیریت پرستاری	مدیریت پرستاری
	(100) ۱۱۵	(87) ۱۰۰	(4/3) ۵	(8/7) ۱۰	ویژه	ویژه
$\chi^2=35/729$ p < 0.001	(100) ۸۷	(78/2) ۶۸	(11/5) ۱۰	(10/3) ۹	جراحی عمومی و ENT	جراحی عمومی
	(100) ۵۸	(94/8) ۵۵	(5/2) ۳	(0) ۰	داخلي	داخلي
	(100) ۴۹	(58/5) ۱۷	(3/4) ۱	(37/9) ۱۱	مدیریت پرستاری	مدیریت پرستاری
	(100) ۳۰۳	(51/5) ۱۵۶	(16/2) ۴۹	(32/3) ۹۸	ویژه	ویژه
$\chi^2=39/117$ p < 0.001	(100) ۲۳۱	(68/4) ۱۵۸	(13) ۳۰	(18/6) ۴۳	جراحی عمومی و ENT	جراحی عمومی
	(100) ۱۵۴	(75/3) ۱۱۶	(3/2) ۵	(21/4) ۳۳	داخلي	داخلي
	(100) ۷۷	(64/9) ۵۰	(6/5) ۵	(28/6) ۲۲	مدیریت پرستاری	مدیریت پرستاری

بروز خطاها کاری مثبت بود (جدول شماره ۲). یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه پرستاران و مدیران

آزمون کای اسکوئر، برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین بخش‌ها از لحاظ علل زمینه ساز

افراد جهت انجام کار اشتباه تنگ کرده و شرایط را برای انجام کار بدون خطا و ارتقاء امنیت و ایمنی بیمار مهیا می‌کند. از طرفی در این رویداد این نکته مورد تأکید می‌باشد که انسان‌ها خطا می‌کنند و اشتباه مورد انتظار است (حتی در بهترین سازمان‌ها) و بهدلیل نام به خصوصی نمی‌گردد و فرد را مقصّر جلوه نداده، و بیشتر به دنبال تشخیص علل زمینه ساز خطا می‌باشد، و تأکید می‌کند که هر اشتباه و نقصی ما را با فرصت پیش‌رفت و ببود عملکرد به‌دلیل افزایش دانش ما از موانع ارائه یک مراقبت ایمن به بیمار روبرو می‌نماید.^(۱۳) Reason (۲۰۰۰) می‌گوید وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، مهم نیست که چه کسی مقصّر است، اما چراً و چگونگی رخداد آن در سیستم مهم است باید به‌دلیل نقاط ضعف سیستم (مدیریت، محیط و ...) که زمینه را برای رخداد خطا مهیا کرده است، باشیم.^(۱۴)

در پژوهش حاضر نقش عمدۀ بعد مدیریت در بروز خطاها کاری از دیدگاه واحدهای پژوهش در تمامی بخش‌ها مورد تأیید قرار گرفت؛ مثلاً عدم تأمین نیروی انسانی کافی (عدم تناسب بین تعداد پرستاران و بیماران) ۸۸/۵ درصد، برنامه ریزی نامناسب کاری (اجرای مراقبت‌های پرستاری بدون برنامه ریزی قبلی) ۸۲/۳ درصد، تدوین شیفت‌های نامناسب کاری (عدم رعایت تناسب بین ساعات کاری پرسنل، ساعت کاری طولانی و انجام شیفت‌های متعدد) ۸۲/۳ درصد، بیشترین نظرات موافق و کاملاً موافق کلیه پرستاران و مدیرانشان در مقایسه با سایر ابعاد، به این بعد مدیریت داده شده است. در تأیید یافته‌های این پژوهش محققین می‌گویند: برنامه ریزی نامناسب مدیران پرستاری، سبب انجام فعالیت‌های غیر اصولی و عدم تناسب امکانات اجرایی با برنامه، سبب استفاده غیر مؤثر از نیروی انسانی و افزایش بارکاری پرسنل

پرستاری، بعد مدیریت مهمترین بعد زمینه‌ساز در بروز خطاها کاری بود ($p < 0.01$, $\chi^2 = 44/261$)، همچنین از دیدگاه‌های واحدهای پژوهش در تمام بخشها در مورد نقش بُعد محیطی تفاوت وجود داشت ($p < 0.001$, $\chi^2 = 35/729$)، از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش در بخش جراحی عمومی و گوش و حلق و بینی (ENT)، بعد مراقبت و پرستاری اهمیت بیشتری در بروز خطاها کاری نسبت به سایر بخش‌ها داشت ($p < 0.001$, $\chi^2 = 39/117$). لازم به توضیح است که در این جدول، نظرات سرپرستاران، سوپر وایزران، و مترون‌ها برای تعیین نوع دیدگاه آن‌ها به علل زمینه ساز خطاها کاری در مراقبت‌های پرستاری به صورت جداگانه و تحت عنوان بخش مدیریت پرستاری مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های این پژوهش، تأییدی بر این نکته است که مطابق با نظر پرستاران و مدیران آن‌ها، علل متعددی زمینه ساز بروز خطاها کاری در مراقبت‌های پرستاری هستند. اولین راه برای کاهش خطاها کاری، تشخیص اولیه علل زمینه ساز بروز آن‌ها می‌باشد.^(۱۵) خطاها کاری در مراقبت‌های بهداشتی نظیر تمام کارهای دیگر غیر قابل اجتناب‌اند و باید پذیرفت که صد درصد نمی‌توان از آن‌ها پیشگیری کرد؛ ولی این امکان وجود دارد تا سیستمی طراحی کنیم که احتمال وقوع خطاها را کاهش داده و اثرات منفی خطاها را در زمان رخ دادن آن کاهش دهد.^(۱۶)

چنین سیستمی با بررسی اجزاء و عناصر سازمانی مؤثر در فراهم آوردن زمینه‌های بروز خطاها کاری و تلاش برای رفع آن‌ها در حد امکان، عرصه را برای

پرستاری در این بخش‌ها به تجهیزات و امکانات پیشرفت‌های مراقبتی مانند مانیتور قلبی، ونتیلاتور و تجهیزات تزریق وریدی و ... است. تاریخچه‌ای در مورد مشکلات محیطی سیستم بهداشت و درمان نشان می‌دهد که موضوعات مالی، پولی، مشکل اواسط دهه ۱۹۹۰ است؛ زمانی که بحران اقتصادی بیمارستان‌ها آغاز گردید و مدیران بهسوی استراتژی کاهش‌های هزینه‌ها روی آوردند. از جمله کاهش پرسنل پرستاری که بخش اعظم هزینه‌های بیمارستان‌ها را بخود اختصاص می‌دهد. مثلاً استفاده بیش از حد از پرستاران با تنظیم شیفت‌های کاری پی‌درپی و تکیه بر پرستارانی که کمتر آموخت دیده‌اند، یا استفاده از افراد کم تجربه و کم صلاحیت در امر مراقبت؛ بنابراین محیط کاری پرسترس و کمبود پرستاران باصلاحیت و کارشناس، سلامت بیمار را بهدلیل افزایش احتمال اشتباهات کاری پرستاری به خطر می‌اندازد. بهترین راه حل آن پیشبرد بیسازی پرسنل بیمارستانی و استفاده و استخدام پرستاران با تجربه‌تر و بهعنوان مدیر یا رهبر در هر بخش است.^(۱۸) پژوهشگران معتقدند، ببینود ۴ جزء محیطی زیر سبب ارائه مراقبت بهتر و ایمن‌تر می‌شود:

- ۱- مدیریت بهتر سازمانی (با تأکید بر تغییر نگرش مدیران در مورد ساعت کاری پرسنل، تأمین نیروی انسانی کافی و کارآمد و...).
- ۲- آرایش دهی نیروی انسانی کافی و کار (تناسب بین تعداد پرستاران و بیماران و کاهش استرس شغلی و...).
- ۳- طراحی شغل و کار (تناسب بین تعداد فرهنگ سازمانی (افزایش مسئولیت پذیری، پاسخگویی، وجودان کاری، و گزارش خطاها کاری).^(۱۹)
- ۴- باید دانست که در بررسی حوادث، پرستاران را بهخاطر اجرای مراقبت در محیطی غیر طبیعی با کمبود امکانات و شرایط لازم برای مراقبت صحیح سرزنش می‌کنند تا دلایل واقعی خطا، که مشخصاً در ضمن اجرای

می‌شود؛ که نتیجه آن کاهش دقیقت کاری و بروز خطاهای پرستاری است. فلورانس نایتینگل در بین اولین متخصصین حرفه‌ای بهداشتی بود که از رویکرد سیستمی در مدیریت اشتباهات انسانی در بیمارستان‌ها حمایت نموده و بر نقش مدیریت پرستاری در بروز اشتباهات کاری صحه گذاشت؛ او در کتاب خود تحت عنوان یادداشت‌هایی در پرستاری (Notes on Nursing) می‌گوید: اشتباهات کشنده و خطرناک در صورت وجود یک سیستم سازمان داده شده برای نظارت و توجه به پرستاران هرگز رخ نمی‌دهد: بنابراین وظیفه مدیر است که راههای بروز اشتباهات را با تشخیص علل زمینه‌سازی که با نقص عملکرد مدیریتی بروز می‌کند، مسدود نماید.^(۱۵) Austin (۲۰۰۰) و Warlik (۲۰۰۱) می‌گویند، مدیران مسئولیت بررسی پرتفکلهای نوشته شده، خط مشی‌ها، استانداردها و پروسیجرها و نظارت بر پیروی از آن‌ها را دارند تا با انجام مسئولیت خود احتمال خطا را کاهش دهند.^(۱۶) آن‌ها باید با شناسایی نقاط ضعف برای جبران آن و جلوگیری از رسیدن صدمه به بیمار به‌واسطه این نقاط ضعف برنامه ریزی کند.

در بعد محیطی، سخن از کمبود امکانات و تجهیزات مناسب شامل خرابی دستگاهها و کمبود امکانات ضروری برای مراقبت‌های پرستاری (۸۴/۴ درصد)، شیفت کاری شباهه، پی‌درپی و با تعداد پرسنل کم (۸۴/۴ درصد)، انجام نقش‌های غیرمرتبط با نقش مراقبتی پرستار (مثلاً فعالیت‌های دفتری روتین یا کاغذ بازی) (۸۰/۲ درصد) به میان می‌آید. همچنین پرستاران بخش‌های ویژه نظرات موافق و کاملاً موافق بیشتری (۱۰۰ پاسخ) نسبت به سایر بخش‌ها به تأثیر این بعد در بروز خطاها کاری‌شان داده‌اند؛ و البته واضح است که علت آن وابستگی بیشتر مراقبت‌های

کاری، برخورد حمایتی مناسب و استفاده از رویکرد مشارکتی و نه استبدادی در بروز استرس‌های منجر به اشتباه مؤثر است.^(۲۱)

در بعد مراقبت و پرستاری پژوهش حاضر، یکی از علل اشتباهات کاری کمبود آگاهی و دانش برای ارائه مراقبت صحیح ۷۷/۱ درصد بود. و پرستاران بخش‌های جراحی عمومی و ENT نظرات موافق و کاملاً موافق بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها به تأثیر این بعد به در بروز خطاها کاریشان داشته‌اند که علت آن را می‌توان به میزان بالای بسترهای بیماران با تشخیص‌ها و بیماری‌های متفاوتی که هر یک نیاز به آگاهی از اصول ارائه مراقبت پرستاری خود را دارند، نسبت داد. بنابراین پرستاران در این بخش‌ها احساس می‌کنند آنچنان که باید و شاید برای ارائه مراقبت در چنین بخش‌هایی آماده نشده اند و کمبود دانش و آگاهی‌های آن‌ها زمینه ساز بروز خطاها کاری در این بخش‌ها می‌باشد. همراه با به روز شدن علوم بهداشتی و کاهش نیمه عمر اطلاعات به دست آمده از مطالعات مختلف، باید راهکاری برای همسو کردن دانش پرستاران بالینی که از کتب و مقالات علمی و اطلاعات به روز به دور هستند، اندیشید. نمی‌توان انتظار داشت تا صرف داشتن اطلاعات دانشگاهی چند سال قبل و حتی چند دهه قبل با تکنولوژی روزه‌گام شد، ولی از اثرات زیان آور این عدم آگاهی و پیامد آن یعنی ناتوانی عملی در کار با روش‌ها و داروهای جدید بی‌نصیب ماند. بیشتر لغزش‌ها و خطاها کاری طبق یافته‌های پژوهش‌های مختلف وقتی رخ می‌دهند که فرد در اجرای یک مراقبت خاص، مهارت پیدا می‌کند. به دلیل کمبود دانش و آگاهی جدید روتین محور می‌شود. بنابراین چنین فردی، دیگر نیازی ندارد تا برای انجام آن کار اطلاعات خود را افزایش داده، آهسته کار کند یا توجه خود را

پرسیجرها در محیطی نامطلوب با کمبود امکانات به وجود می‌آیند.^(۲۰) از طرف دیگر مشکلات بعد محیطی سبب بروز استرس کاری می‌شود، استرس شغلی زمانی رخ می‌دهد که نیازمندی‌های شغلی با توانایی‌ها، منابع یا نیازهای کارمند تناسب ندارد. پژوهشگران ۶ عامل مؤثر در بروز استرس شغلی در پرستاری را تشخیص داده‌اند: بار کاری زیاد، مدیریت و رهبری غیر مؤثر، تضاد حرفة‌ای با دیگر اعضای تیم مراقبت، تقاضای عاطفی برای مراقبت (پرستاری، حرفة‌ای است که ارائه مراقبت به بیماران نیازمند همراهی آن مراقبت با عکس العمل‌های عاطفی پرستار است)، فقدان پاداش و انگیزه، عدم حمایت از طرف سایر همکاران یا مدیران، منابع ناکافی و عدم مشارکت در تصمیم‌گیری و خطم‌شی سازی و... نیز عامل فشار و استرس است. عوامل استرس‌زای دیگر مانند تکنولوژی در حال تغییر، آموختش کم، کاغذ بازی زیاد، ارتقابات غلط و ناکافی می‌باشد.^(۲۱) مواردی اعم از شیفت‌های نامناسب کاری (عدم تناسب بین ساعت کاری پرسنل، ساعت کاری طولانی و انجام شیفت‌های متعدد) عاملی برای ایجاد استرس کاری می‌باشد؛ در مطالعه‌ای در مورد استرس‌های شغلی توسط Rogers و همکاران که پرستاران ۳۶۲ بیمارستان را از نظر بروز اشتباهات پرستاری در ۲۸ روز پیاپی تحت نظر گرفتند و دریافتند که میزان اشتباهات با افزایش شیفت کاری پرستاران به ۱۲ ساعت یا بیشتر، افزایش چشمگیری می‌یابد. کمبود خواب تا ۲ ساعت خواب در شبانه روز اثراتی نظیر کاهش هوشیاری، بدتر شدن خلق و کاهش اثراتی، از بین رفتن توانایی قضاوت، کاهش آگاهی از عملکرد، از بین رفتن توانایی تصمیم‌گیری، کاهش حافظه، کاهش سرعت واکنش در واحد زمان، فقدان تمرکز و... را دارد.^(۲۲) در این زمینه تدوین مناسب تر برنامه‌های

خطاهای کاری آگاه ساخته و رویکرد تازه‌ای برای برنامه‌ریزی و توجه بیشتر به اینمی مراقبت و حفظ سلامت بیمار تبیین نماید.

تقدیر و تشکر

پژوهشگران از کلیه پرستاران و مدیران پرستاری که در انجام این پژوهش مارا یاری نمودند قدردانی نمایند.

فهرست منابع

- 1- Reason J. Human Error. New York: Cambridge university press; 1990.p. 9.
- 2- Johnstone MJ, Kanitsaki O. The ethics and practical importance of defining, distinguishing and disclosing nursing errors: A discussion paper. Int J Nurs Stud; 2006.43: 367-376.
- 3- Kuhn A, Youngberg B. The need for risk management in to evolve to assure a cultural of safety. Qual Saf Health Care; 2002. 11(2): 158-162.
- 4- Leung WC. Concept to treatment in the A and B department. Accid Emerg Nurs; 2002. 10:17-25.
- 5- Burroughs TE, Waterman AD, Gallagher TH, Waterman B, Adams D, Jeffe DB. Patient concerns about medical errors in emergency departments. Acad Emerg Med; 2005. 12(4): 57-65.
- 6- Freeman Cook A. Patient safety: Disagreement on medical error, Reporting may place patients at Risk. J Obes, Fit Wellness Week; 2004.8:811.
- 7- Gillis Hall L. Nursing intellectual capital: A theoretical approach for analyzing nursing productivity. Nursing economics; 2003. 21(1): 14-20.
- 8- Simpson RL. Stop the rise in nursing errors systematically. Nurs Manag; 2000.31: (11): 21-22.
- 9- Penjoveini S. The study of prevalence and type of medication errors among staff nurses of educational hospitals in Sanandadje. The Journal of Nursing Research; 2006. 1(1): 59-64 (in Persian).

روی کار متمرکز کند؛ این حالت با انحراف حواس و بی توجیهی در اجرای آن کار همراه است. در پژوهش‌های انجام شده، پرت شدن حواس یا لغزش ذهنی عامل ۱۱ درصد خطاها تجویز داروها، ۱۲ درصد خطا در تزریق دارو و ۷۳ درصد خطاها در نسخه برداری (وارد کردن دستورات از نسخه پزشکی به کاردکس) بوده است.^(۳۳) به روز کردن دانش و یادآوری مجدد آن از این انحراف حواس جلوگیری می‌کند.

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و مطالعات انجام شده در این زمینه و با آگاهی از این که رفع بسیاری از علل زمینه ساز بروز خطاها کاری منوط به آگاهی از شرایط بهروز آن است، بنابراین اولین قدم در کاهش خطاها کاری، ایجاد محیطی است که در آن هر یک از اعضای پرسنل پرستاری در صورت انجام خطا کاری، صادقانه خطا خود و دلیل این رخداد را به سایر همکاران، مدیران و اعضای تیم درمان بیان نمایند تا صدمه وارده به بیمار جبران شود. بنابراین مسئولین ذیربط اطلاعات مربوط به انواع خطاها، شرایط حاکم حین رخداد خطاها (شیفت، تعداد پرسنل، ویژگی فردی پرسنل و...)، جمع‌آوری نموده و در جهت رفع علل زمینه ساز این خطاها به کار گیرند.^(۴)

با توجه به امکانات محیطی کشور، تلاش برای کاهش‌دادن و کنترل خطاها کاری پرستاری، می‌تواند ممکن بر استفاده از رویکرد سیستمی (با تأکید بر ابعاد مدیریت، محیط و مراقبت و فردی) برای بررسی عوامل زمینه ساز، رفع کردن این عوامل در حد امکان و طراحی سیستمی برای افزایش میزان گزارش‌دهی خطاها برای شناسایی نقاط ضعف و خطر ساز توسط پرسنلاران و برنامه‌ریزی برای رفع علل زمینه ساز خطاها کاری باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند پرسنلاران و مدیران پرستاری را از ابعاد زمینه ساز بروز

- application. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.p. 578-585.
- 17- Warlick DT. Negligence goes to the top. Nurs Manag; 2000. 31(6): 22-24.
- 18- Simpson RL. Stop the rise in nursing errors systematically. Nurs Manag; 2000. 31(11):21-22.
- 19- Simpson R, Technology and the IOM: Making the work environment safer. Nurs Mngm; 2004.35(2):20-23.
- 20- Green M. Nursing error and human nature. J Nurs law;2004. 9(4): 37-45.
- 21- Welker-Hood K. Does work place stress Lead to accident or error?. Adv J Nurs; 2006. 106(9): 104.
- 22- Tabone S. Nurse fatigue: The human factor. Texas Nurs; 2004. June/July: 1-3.
- 23- Leap LL, Bates DW, Gullan DJ, Cooper J, Demonaco HJ, Gallivan T. Systems analysis of adverse drug events. JAMA;1995. 274: 35-43.
- 10- Kingston M, Evans S, Smith B, Berry J. Attitude of doctors and nurses towards incidents reporting: A qualitative analysis. Med J Aust; 2004.18(11): 36-39.
- 11- Faugier J, Ashworth G, Lancaster J, Ward D. An exploration of clinical risk management from a Nursing prospective. NT Res; 1997.2(2): 97-107.
- 12- Kohan L, Corrigan J, Donaldson M. To err is human: Building a safer health system.; Washington: National academy press;2000.p.1-10
- 13- Walshe k. Medical accident in the UK: A wasted opportunity for improvement? In: Rosenthal, M., Mulcahy, L., Llova-Bostock, S. (Eds.), Medical mishaps: Process of the puzzle. Bucking ham: Open University press;1999.p. 59-73.
- 14- Reason R. Human error: Models and management. Br Medical J; 2000.p. 320, 768-770.
- 15- Tappin RM. Nursing leadership and management: Concepts and practice. 4th ed. Philadelphia: F.A.Davis Company; 2001.p. 375-392.
- 16- Marquis BL, Hustone CJ. Leadership roles and management functions in nursing: Theory and

Survey of Predisposing Causes of Working Errors in Nursing Cares from Perspective of Nurses and Their Managers Perspectives

*M. Anoosheh¹ PhD F.Ahmadi² PhD S. Faghihzadeh³ PhD
M. Vaismoradi⁴ MS

Abstract

Background & Aim: Working errors are inevitable in every profession including health care professions, but in nursing it is of greater importance, because of its inalienable damages to patients. Study of predisposing factors of these errors is the first step to control and decrease errors during nursing care. The purpose of this study was to survey predisposing causes of working errors in nursing cares from perspectives of nurses and their managers and also to examine the importance of different predisposing domains in different wards in year 2007.

Material & Method: This research is a descriptive study in which cluster random sampling method was used. Ninety six nurses and nursing managers from 3 selected educational hospitals in Tehran participated in this study. Data were collected by a questionnaire and analyzed by descriptive and inferential statistics.

Results: From perspective of nurses and nursing managers, different factors in domains of management, environment, and care and nursing were considered as predisposing factors to nursing errors. Also, there were a statistically significant difference between wards in terms of predisposing causes of working errors ($P<0.001$).

Conclusion: Regarding impossibility of absolute suppression of nursing errors, struggle for controlling and decreasing nursing errors depends on using a systematic approach with emphasis on management, environment, care and nursing domains when assessing predisposing factors and planning appropriate intervention.

Key Words: Nursing Errors, Predisposing Causes, Nursing Care, Nurses, Nurse managers.

Accepted for Publication: 26 Desember 2007

Submitted for Publication: 5 may 2007

¹ Assistant Professor in Nursing Education, School of Medicine, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran (*Corresponding Author).E-mail: anoosheh@modares.ac.ir.

² Associate Professor in Nursing Education, School of Medicine, Tarbiyat Modares University.

³ Professor in Statistics, School of Medicine, Tarbiyat Modares University.

⁴ MS in Nursing Education, School of Medicine, Tarbiyat Modares University.